



Bot. Diet.
P94.3



Recd Jan. 1896.



Verzeichniß

derer inn- und ausländischen

Bäume, Stauden

und

Sommer-Gewächse

des

Caspar Bosischen Gartens

in vier Ordnungen

wie solche sich im Jahr 1747 befunden

durch

Johann Ernst Probst

der Zeit Gärtner.

Leipzig,

Gedruckt bey August Samuel Crucigern, 1747.

Keine andere als diejenige, welche
bey Herausgebung derer übrigen
Verzeichnisse habe, nemlich de-
nen Garten-Freunden hierdurch
Kund zu thun, womit ihnen aus
dem Caspar Bosischen Gar-
ten kann gedienet werden, und
würde also vergeblich seyn, wenn
man darin Beschreibungen von
obengemeldeten Sachen suchen
wolte. Uebrigens wird der geehrte
Leser gebethen, solches als ein Zei-
chen meiner Dienstfertigkeit anzu-
sehen, womit mich demselben zur
beständigen Gewogenheit bestens
empfehle.

Leipzig,
den 10. Aug. 1747.

CLASSIS PRIMA PLANTARVM

IN HIBERNACVLO ADSERVANDARVM.

A.

ABROTANVM Africanum, folio tere-
reti, tridentato.

- - Delphinii folio.

ABSINTHIUM latifolium arborescens.

- - maritimum, Lauendulae folio.

- - folio tenui, multifido, camphoram
spirans.

- - insipidum & inodorum.

- - Seriphium gallicum.

ACACIA vera, folio scorpioidis legumi-
nosae.

- - quae Acaciae similis Americana, spi-
nis cornu similibus.

- - Americana, spinis albis, longis, cras-
sioribus.

- - Africana, quae Acaciae similis, foliis
myrti parvis, aculeatis, pinnatis,
flore coccineo, tetrapetaloide.

- - non Spinosa Fore albo.

ACANTHVS satius, mollis Virgilii.

- - rarioribus & breuioribus aculeis.

A

ACER

ACER maximum, foliis trifidis, aut quin-
quifidis, Virginianum.

ACETOSA arborescens, subrotundo fo-
lio, Insul. Fortunat.

ACRIVIOLEA, flore pleno, maiore.

ADHATODA maior; Ecboium.

- - minor Zeylanensium, angustifolia,
flore luteolo.

AGERATVM Peruvianum, arboreum,
foliolato, ferrato.

AGRIMONIA, orientalis, humilis, radice
crassissima repente fructu in spi-
cam breuem congesto.

ALATERNOIDES Africana, Ericae fo-
lio, floribus albicantibus, et mu-
scosis.

- - Africana, Lauri ferratae folio.

- - folio oblongo ferrato.

- - folio rotundo non ferrato.

ALATERNVS Hispanica, folio latiore.
- - latifolia, Celastrus dicta, folio ex au-
reo et viridi variegato.

- - Africana, Lauri ferratae Stapelianae
foliis.

- - argentea, seu foliis ex albo variis.

- - aurea, foliis ex aureo variis.

ALKEKENG, fructu paruo verticillato.

ALOE, vulgari similis, maior, maculis
albis picta, succo foetidiore; vera
vulgaris.

- A L O E vera, minor ; Succotrina angustifolia, spinosa, flore purpureo.
- - Americana, muricata.
 - - Americana, muricata, foliorum margine luteo.
 - - Americana, folio viridi, rigidissimo, foetido ; Piet dicta.
 - - Americana, folio Yuccae, arborefcens.
 - - Zeylanica, pumila, folio variegato.
 - - Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem ambientibus, spinosis.
 - - Africana, caulescens, folio crasso, obscure viridi, spinis ad latera, et in dorso armato.
 - - Africana caulescens, maculata, spinosa maior.
 - - Africana, caulescens, perfoliata, glauca, non spinosa.
 - - Africana, arborefcens, montana, non spinosa, folio longissimo, plicatili, flore rubro.
 - - Africana, margaritifera maior, folio in summitate triangulari, flore subuiridi.
 - - Africana, margaritifera minor.
 - - Africana, margaritifera, minima.
 - - Africana humilis, spinis inermibus, et verrucis obsita.
 - - Africana, folio breuissimo, crassissimo, flore subuiridi.

ALOE Africana, sessilis, foliis carinatis, verrucosis.

- - Africana, humilis, arachnoidea.
- - Africana, minima, atrouiridis, spinis herbaceis numerosis ornata.
- - Africana, humilis, triangularis, folio ex albo et viridi variegato.
- - Africana, ab vtraque parte albicantibus maculis notata.
- - Africana, flore rubro, folio plano, verrucis, ab vtraque parte albicantibus notata.
- - Africana, erecta, rotunda, folio paruo, et in acumen rigidissimum exeunte.
- - Africana, folio triangulo, longissimo, et angustissimo, floribus luteis, foetidis; Iris vuaria, vulgo dicta.
- - Africana, humilis, folio ex albo et viridi variegato, florum petalis reflexis, rubris.
- - Africana, caulescens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, et in mucronem obtusorem desinentibus.
- - Guineensis.

ALTHAEA frutescens Lusitanica, folio rotundiore, vndulato, ad solem micante.

- - frutescens folio Bryoniae.

ALTHAEA peregrina, erecta, flore purpureo, striato; **Althaea** frutex.

- - maritima, arborea, veneta.

AMARANTHVS Siculus, radice perenni.

AMYGDALVS nana, flore pleno.

ANACAMPSEOS frutescens, folio Portulacae maiore; **Crassula**. **Telephium** Portulacae folio.

ANAGYRIS foetida, Cretica, oblongis foliis, floribus luteis.

ANANAS aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea.

- - aculeatus, fructu pyramidato, carne rubra.

- - sylvestris, Brassiliana; Kerbita.

- - Americana, sylvestris.

- - non aculeatus, Pitta dictus.

- - folio vix serrato, lucide virens.

- - foliis per maiora intervalla dispositis.

- - aculeatus folio rubescente.

ANEMONE virginiana latiore folio.

ANONIS purpurea, praecox.

ANTIRRHINVM, angusto folio **Linariae**, eleganter variegato, flore rubro, rictu luteo.

APIVM Macedonicum.

APOCYNVM Americanum, folio **Androsaemi** maioris, flore **Lilii** conual-
lium suauerubente.

APOCYNVM erectum, fruticosum, folio
subrotundo, glauco.

- - erectum, Africanum, Salicis folio,
fructu villoso.

- - erectum flore purpureo.

AQVIFOLIVM, folio aurato.

ARBVTVS folio serrato.

ARISTOLOCHIA Indica, aromatica.

- - Cretica, Pistolochia dicta.

ARTEMISIA Delphinii folio viridi cau-
le rubello.

- - foliis variegatis.

ARVM Africanum, flore albo, odorato,
moschato.

ARVND sativa, hortensis.

- - Indica variegata.

ASCLEPIAS Africana Aizooides, A-
phylla.

- - Africana Aizooides, flore pulchre
fimbriato, maior.

- - Africana Aizooides, folio compresso
digitato.

- - flore nigro.

ASCYRVM Balearicum, frutescens, flore
luteo, foliis minoribus, subtus ver-
rucosis; Myrto-Cistus Pennaei.

ASPHODELVS, flore albo, striato.

- - maritimus flore albo.

ASTER maritimus, flauus; Crithmum
chrysanthemum, folio tereti, crasso,
tridentato.

ASTER

ASTER folio in summo obtuso; ceterum praecedentis similis.

- - glutinosus et graueolus.

ASTERISCVS annuus, foliis ad florem rigidis; Chrysanthemum.

- - maritimus, patulus; Aster supinus.

- - seu Asteriscoides, radio longiore, angustifolius; Aster Austriacus.

ASTRAGALOIDES Lusitanica, Astragalus Boeticus.

ASTRAGALVS Orientalis Caule ab imo ad summum florido.

- - tuberosus scandens.

- - maritimus procumbens.

ATRIPLEX, seu Halimus frutescens latifolius; Portulaca maritima.

- - seu Halimus angustifolius, fruticosus, procumbens.

AZEDARACH, seu Arbor Fraxini folio, flore coeruleo.

BARBA IOVIS, flore albo.

- - lagopoides, Cretica, frutescens, incana, flore spicato, purpureo.

- - incana, flore luteo.

BASELLA Horti Malabarici.

BERMVDIANA, Iridis folio, flore coeruleo.

BIDENS Indica, Hieracii folio, caule alato; Chrysanthemum Curassauicum.

BIGNONIA Americana arbor, flore luteo, Fraxini folio; Clematis.

BRYONIA Zeylanica, foliis profunde laciniatis, floribus luteis, baccis rubellis.

- **Africana**, laciniata, radice tuberosa.

BVGLOSSVM orientale flore luteo.

BVGULA orientalis villosa flore inuerso coeruleo alba macula notato.

BUPLEVRIODES siue arbor umbellifera; Simpla nobla Canariensis.

BUXVS arborescens.

- foliis auratis, variegatis.

- maior foliis per Limbum aureis H.
R. P.

C.

CALAMINTHA montana, praealta, Pulegii odore, dentatis foliis, floribus coeruleis dilutis.

CAMPANULA maior, lactescens, pyramidalis.

CAMPHORA officinarum; Camphorifera arbor.

CANNACORVS latifolius, vulgaris, flore rubro; Canna Indica.

- flore coccineo, splendente.

- flore luteo punctato.

- angustifolius, flore flauescente.

- latifolius, flore coccineo, punctato.

- semine minore, ex Mechoacan.

CAN-

CANNACORVS maiori, angustiore, ac
acutiore folio, flore magno flau-
scente, punctis rubris vario.

- - latifolius, vulgaris, foliis varie-
gatis.

- - glaucophyllus angustifolius.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, fo-
lio rotundo; vera.

CAPSICVM Brasiliense, filiquis mini-
mis, oblongis, flauis.

CARAGANNA Siberica.

CARDVVS ferox.

CARTHAMVS Africanus frutescens, fo-
lio Ilcis spinoso, flore aureo.

CARYOPHILLATA Canadensis.

CARYOPHYLLVS, Flore ex spica pro-
deunte, flore rubente.

- - flore cinereo.

- - flore luteo.

- - siue Tunica sylvestris, flore pallido
roseo, prolifero, id est, vno post al-
terum ex eodem perianthio suc-
crescente.

*Reliquos peculiaris Catalogus re-
censet.*

CASSIA Americana foetida, foliis ob-
longis, glabris Orobi, odore opii vi-
roso.

- - Americana, foliis longis, glabris, odo-
re minus viroso; Cassia Fistula Ale-
xandrina.

CASSIDA Orientalis Chamaedryos folio
flore luteo.

CATARIA angustifolia maior, flore coe-
ruleo purpurascente.

- - Lusitanica, erecta, folio Betonicae,
tuberosa radice, flore coerulescen-
te.

- - quae Horminum spicatum, flore et
odore Lauendulae.

- - quae Sideritis Canadensis altissima
Scrophulariae folio flore flau-
scente.

CEDRVS, folio Cypressi, fructu flau-
scente; Oxycedrus.

CELTIS, fructu nigricante; Lotus ar-
bor.

CERASVS Hottentottorum, folio fere
oblongo, rotundo, crassissimo.

CERATOCEPHALOS Virginianus fo-
liis laeuius flore luteo radiato.

CEREVS erectus, altissimus, Surinamen-
sis, spinis fuscis, costarum numero
varians.

- - erectus, fructu rubro, non spinoso
lanuginosus, spinis albis.

- - erectus, spinosissimus, spinis flauis,
polygonus, lanugine alba, palle-
scente.

- - erectus, quadrangulus, costis alarum
instar adfurgentibus.

- - scandens minor, trigonus, articulatus.

CERE-

CEREVS scandens maior, trigonus, lucidus, variegati coloris.

- - scandens minor, polygonus, articulatus.

- - Indicus, scolopendrii folio, plano glabro, brachiato.

- - erectus, gracilis, polygonus;

CHAMAELAEA tricoecos.

CHAMOMILLA maritima Absinthii folio crasso.

CHENOPODIUM sedi folio minimo; Sedum frutescens, Ericae folio.

CHRYSANTHEMOIDES osteospermum, Africanum odoratum, spinosum, viscosum.

CINARA acaulos.

CIRSIVM tuberosum, lactucae capitulis spicatis, floribus parvis purpureo-violaceis.

CISTVS, Ladanifera.

- - mas, maior, folio rotundiore, flore purpureo.

- - mas, foliis undulatis, et crispis.

- - foemina, viridibus foliis salviae, clatior, flore albo.

- - foliis rosmarini; Ledon.

CLEMATITIS Canadensis trifolia, densata, flore albo.

CLVTIA Frutex Aethiopicus Portulacae folio, flore ex albido virescente.

CNICVS perennis, flore coeruleo; Tingtitanus.

COCHLEARIA Glaſti folio.

COLOCASIA; Arum Aegyptiacum.

- - Caulo puniceo.

COLVTEA Aethiopica, flore phoeniceo, folio Barbae Iouis.

COMA aurea Africana, elatior, lini folio, ſimilis Germanicae; ſed flore maiore.

- - aurea africana fruticans foliis glaucis et in extremitate trifidis.

CONVOLVULVS Syriacus, Scammonium dictus.

- - minor, ſpicae folio.

- - Althaeae, vel Bryoniae folio, flore carneo.

- - maritimus noſtras rotundifolius.

CORALLODENDRON triphyllum ſpinoſum flore ruberrimo.

CORONA SOLIS arborea, folio latiffimo Platani.

- - flore pleno.

CORONILLA Hispanica fruteſcens, maior;

- - ſcorpioides argentea, Cretica.

COTINVS coriaria Plinii.

COTYLEDON, Afra, arboreſcens, maior, foliis glaucis, oblongioribus, flore luteo.

COTYLEDON Afra, frutescens, foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo, et maculis viridibus ornatis; similis Sedo.

- - maior arborescens, Afra, foliis minoribus, crassissimis, viridioribus, minutissime punctatis; Capensis, folio semilobato.

- - Afra frutescens, flore umbellato, coccineo.

- - Afra, folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo.

- - Afra, folio minori, tereti, acuminato, viridi, Ficoidis facie, flore albo; Sedum Africanum, umbellatum, album.

- - Afra, frutescens, foliis longis, retusis depressis, et cruciatis, flore luteo.

CRITHMUM; Foeniculum matitimum minus.

- - maius, odore apii.

CYCLAMEN flore albo breui.

- - aestiuum persicum flore rubro, odorato.

- - Hederae folio autumnale flore albo.

- - Hederae folio autumnale, orbiculato circumroseo folio subtus rubente odorato flore.

- - Hederae folio, autumnale flore carneo.

- - folio rotundo

CYCLAMEN hyemale, folioglabbro, flore pallido rubro.

- - hyemale, folio variegato flore sub-
tus purpureo.

CYNOGLOSSA argentea cretica.

CYPRESSVS meta in fastigium conuo-
luta.

- - ramos extra se spargens, mas.

CYTISVS, glabris foliis, subrotundis,
frutescens; Trifolium arborescens.

- - Africanus, argenteus.

- - viridis.

- - Genista.

D.

DORIA, quae Iacobaea Orientalis, Li-
monii folio.

DORYCNIVM Monspeliensium.

DRACUNCVLVS polyphyllus caule
maculato.

- - Foliorum venis albis.

E.

ELICHRYSVN, sylvestre, latifolium,
flore paruo singulari.

- - sylvestre, folio angustiori, longiori,
superius viridi, inferius incano,
flore singulari; Heliochrysum
faxatile.

- - foetidissimum, Africanum, latifo-
lium, calyce aureo.

- - foetidissimum, Africanum, latifo-
lium, calyce argenteo.

ELICHRYSVM Africanum, arboreum,
folio Salviae, odore Rorismarini;
Elichryso affinis.

EMERVS Americanus filiqua incur-
ua.

EPHEDRA, maritima maior.

ERYNGIVM marinum.

EVONYMO Affinis, Aethiopica, semper
virens, fructu globofo, scabro, fo-
liis Salicis, rigidis, ferratis.

EUPHORBIVM, enneagonum, cerei ef-
figie, caulibus crassioribus, spinis
validioribus armatum.

- - octogonum, cerei effigie.

- - heptagonum, cerei effigie.

- - heptagonum, spinis longissimis, in
apice frugiferis.

- - Afrum, polygonum, spinosum, cau-
le tuberibus ornato, Tithymalus
aizooides, spinis validissimis.

- - tetragonum, et pentagonum, spino-
sum; Tithymalus.

- - Afrum, caule simplici, squamato, tu-
beroso; Tithymalus.

- - Afrum, caule simplici, squamato,
Chamaenerii folio; Tithymalus.

- - Afrum, minus, caule squamato, tu-
beroso, et simili Asclepiadis aizooi-
dis minoris.

- - trigonum, seu verum antiquo-
rum.

Ev-

- EUPHORBIVM** trigonum, erectum,
minus, brachiatum; Tithymalus.
- - angulosum, foliis Nerii latoribus;
Tithymalus aizoooides, arboreescens.
- - quod anteuphorbium.

F.

- FABAGO**, Belgarum, siue Peplus Parisiense; Capparis leguminosa.
- - Afra frutescens, minor, flore flauo, magno, vnguibus petalorum fuscis; Capensis minor.
FERVLA Hispanica lucida.
FICOIDES Africana, quae Mesembryanthemum. Tripolii succulento folio, flore argenteo.
- - Africana, quae Mesembryanthemum, Bellidiflorum.
- - Afra, erectior, folio Calendulae, flore aureo; Chrysanthemum.
- - Africana, acaulos, foliis Aloes latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo; Mesembryanthemum, folio scalprato.
- - Africana, acaulos, folio triangulari, lucido, obtuso, flore aureo, magno.
- - Africana, acaulos, foliis triangularibus, longissimis, punctatis.
- - Africana, quae Mesembryanthemum tortuosum, foliis semperuiui, congestis, candidis floribus.

FICOIDES Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore violaceo; Mesembryanthemum radiatum, ramulis prolixis, recumbentibus.

- - Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore purpureo-violaceo; Mesembryanthemum radiatum humile.

- - Africana, folio triangulari, securis forma; Mesembryanthemum folio dolabriformi, flore extus coccinneo, intus aureo.

- - Africana, folio triangulari, glauco, perfoliato, breuissimo, apice spinoso; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus, diacanthis.

- - Africana frutescens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis maioribus, triacanthis, flore dilute purpureo.

- - Africana, folio triangulari, crasso, breui, glauco, ad tres margines aculeato; Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, minus, flore purpurascense.

- - Africana, quae Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, maius, floris colore violaceo.

- FICOIDES Africana, fruticans, folio triangulari, scabro, tenui; Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus expansis.
- - Africana; Mesembryanthemum crassifolium, repens, flore purpureo.
 - - Africana, quae Mesembryanthemum, foliis verruculiformibus, floribus melinis, umbellatis.
 - - Africana, quae Mesembryanthemum frutescens, flore purpureo, rariore.
 - - Africana, siue Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo.
 - - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, maius, flore purpureo, mediocri.
 - - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, minus, flore carneo, minore.
 - - Africana, fruticosa, caule, lanugine argentea ornato, folio tereti, paruo, longo, guttulis argenteis, quasi scabro; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo.
 - - Africana, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo pallidiore.
 - - Africana, quae Mesembryanthemum micans,

micans, flore phoeniceo, filamentis
atris.

FICOIDES Africana, quae Mesembry-
anthemum pugioniforme, flore
amplo, stramineo.

- - Africana, erecta, foliis oblongis, tri-
angularibus, glaucis, et punctatis,
flore luteo.

FICUS, communis.

- - Bengalensis, folio subrotundo.

- - fructu rubro.

FRUTEX peregrinus, horto Bosiano
Yerua mora. **BOSIANA** nunc Lin-
naeo dictus.

G.

GALANGA, maior.

GALE seu Rhus myrtifolia, monspelica.

GENISTA, iuncea, Hispanica.

- - iuncea flore pleno.

GENISTELLA, herbacea, flore luteo ;
Chamaespartium.

GERANIVM, Africanum, Alchimillae,
hirsuto folio, medio, obscuriore cir-
culo notato, floribus rubicundis.

- - Africanum, arborescens, maluae fo-
lio, argentato.

- - Africanum, arborescens, maluae fo-
lio, plano, flore eleganti, Kerme-
fino.

- - Africanum, foliis inferioribus Afari,

superioribus Staphidisagriae, splendentibus, et acetosae sapore.

GERANIVM Africanum, vitis folio, odore Melissae.

- - Africanum, Alchimillae, hirsuto folio, floribus albidis.
- - Africanum, triste, noctu olens, folio longo, laciniato, hirsuto.
- - Africanum, tuberosum, et nodosum, aquilegiae folio, noctu olens.
- - Africanum, frutescens, foliis crassis, glaucis, acetosae sapore.
- - Africanum, Betonicae folio.
- - Africanum, frutescens, alcaeae folio, flore coccineo, fulgidissimo ;
- - haematodes, flore variegato ; Lancastrense.
- - hirsutum odoratissimum.

GNAPHALIVM, maritimum.

GRANADILLA, pentaphyllos, flore coeruleo, magno.

- - folio tricuspidi, flore paruo, flavescente.

GVAIAVA, Americana, arborescens, alba, dulcis.

GVIDONIA, Vlmi foliis, floribus roseis Vlmi facie, arbuscula Aethiopica.

H.

HAEMANTHVS, Africanus, H. L. B. caule maculato ; Narcissus Indicus, puniceus.

HAR-

HARMALA Dodonaei.

HEDERA, monophyllos, conuoluuli folio; siue Menispermum, aut clematis Virginiana scandens, hederaceo folio.

HEDYSARVM, triphyllum, Canadense.

HELIOTROPIVM, Canariense, arbore-scens, Scorodoniae folio.

HERMANNIA, frutescens, folio Ibisci, hirsuto, molli; Ketmia.

HORMINVM sanguineum radice tuberosa.

HYACINTHVS, Indicus, tuberosus.

- - Indicus, tuberosus, flore pleno, albo.

- - stellatus Peruanus.

HYOSCYAMVS, albus, maior, vmbilico floris viridi.

- - maior, albo similis, vmbilico floris atro purpureo.

- - Creticus, luteus, maior.

HYPERICVM, frutescens, Canariense.

- - frutescens, foetidum, minus.

I **I.**

IACEA, arborea, argentea, Rhagufina.

- - luteo flore, capite spinoso, folio integro, alio diuiso; Carduus Graecus, erysimi folio.

- - Lusitanica semper virens.

IACOBAEA, maritima.

- - maritima, latifolia.

- I A S M I N V M**, vulgatus, flore albo.
- - humilius, magno flore, Catalonicum.
 - - humile, luteum.
 - - luteum, vulgo dictum bacciferum.
 - - Indicum, flauum, odoratissimum.
 - - azoricum, trifoliatum, scandens, flore albo, odoratissimo.
 - - Arabicum, aurantii folio, flore albo, pleno.
 - - Arabicum flore simplici.
 - - quod Coffee arbor; Iasminum Arabicum, Castaneae folio, flore albo, odoratissimo.
- I V N I P E R V S**, Bormudiana.
- - Virginiana foliis vbique Iuniperinis,

K.

- K E T M I A**, Syrorum quibusdam, flore coeruleo.
- - Syrorum, flore purpureo - violaceo.
 - - Syrorum, flore albo.
 - - Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici.
 - - Africana, populi folio; Althaea rosea, peregrina.
 - - Aegyptiaca, semine moschato, Abelmosch dicta
 - - Americana, folio Papayae, flore magno, flauescente, fundo purpureo, fructu

fructu pyramidali, hexagono, erecto; folio Manihot serrato.

KLEINIA, Tithymaloides Nerii Folio.
L.

L APATHVM, praestantissimum, Rhabarbarum.

LARIX.

LAVENDVLA, folio multifido.

- - folio multifido, flore albo.

- - folio multifido tenuiter dissecto.

- - latifolia.

LAVRO Cerasus.

- - folio variegato.

LAVRVS, Indica.

- - latifolia mas.

- - vulgaris mas.

- - vulgator, folio elegantissimo, variegato, aureo.

- - vulgaris folio undulato.

LENTISCVS, vulgaris.

LEONVRVS, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, maiore.

- - maior, capitis bonae spei; Melissae folio.

- - Americanus; Cardiaca Nepetae folio.

LEV CANTHEMVM, Canariense, sapore pyrethri.

LEVCOIVM, frutescens, folio argentato, flore luteo, pleno; et plures Leucii species.

LEVCOIVM maritimum laciniatum.

- - Foliis crispis.

LIGVSTRVM, foliis e luteo variegatis.

LILAC Syringa Persica.

- - foliis Laciniatis.

LILIO-NARCISSVS, Indicus, saturato colore purpurascens.

- - Indicus, flore albo, exterius rubente.

- - Iacobaeus, flore sanguineo, nutante.

LIMONIVM, maius; Behen rubrum.

- - minus, Bellidis folio, flagellis foeniculaceis.

- - peregrinum, foliis Asplenii.

- - Gallas ferens.

LINV M maritimum luteum.

LOTVS, Polyceratos, frutescens, incana, alba, maior, latifolia; Lybica Dalechampii.

- - polyceratos, frutescens, incana, alba, siliquis curtis; haemorrhoidalis.

- - polyceratos, frutescens, Cretica, argentea.

- - angustifolia, flore luteo, et purpureo, ex Insula S. Iacobi.

LYCHNIS, frutescens, myrti folio; Been albo similis.

- - Graeca, sedi arborescentis folio et facie, flore albo.

LYSIMACHIA, semper virens, spicata, flore albo; Ephemerum.

- - Canadensis, flore luteo, folio Ialappae.

MAIO-

M.

MAIORANA, folio rotundo.

MALVA, humifusa, minima Sherardi.

MALVS AVRANTIA Anglica Folio et
Fructu variegato.

- - Agostarolo, quae mense Augusto maturat.

- - Co Fior et Foglie rossigiane, Flore foliisque rubellis.

- - Con Scorza grossa, cortice crasso.

- - Con Scorza sottile, cortice tenui.

- - Bergamoto.

- - Lusitanica, di Portugal

- - Cretica, foliis crispis, di Candia co Foglie rizzate.

- - Cretica Foliis planis, di Candia con Foglie Lisse.

- - Flore duplici, con Fior doppio.

- - Folio crispo longo.

- - Folio crispo rotundo.

- - Folio crispo, folio et fructu variegato, Riche depouille.

- - Folio angusto, folio et fructu variegato: Turcica seu Turquine angustifolia.

- - Folio obtuso cortice crasso.

- - Folio Salicis.

- - Fructu acido maiore.

- - Fructu acido minore.

MALVS AVRANTIA Fructumalo Citrio praegnante, Foetifera: Bizaria Limonata.

- - Fructumalo Citrio praegnante Folio ex albo variegato.
- - Fructu acri dulcique medulla maiore.
- - Fructu acri dulcique medulla minore.
- - Hierichunteum medulla rubra.
- - Fructu corniculato seu Hermaphroditicum.
- - Fructu virgato et striato.
- - Fructu stellato.
- - Fructu verrucoso.
- - Fructu maximo verrucoso. Gigante verrucoso.
- - Nana.
- - Fructu pyriformi: Peretto.
- - Fructu mellis odore: Mellerosa odorata.
- - Fructu melonis: Incanellato.
- - Fructu Limae, inlimata.
- - Fructu Limonii: Limonii facie,
- - Fructu monstroso; foliis crispis.
- - Sylvestris.
- - maior cortice amaro medulla suaue dulci.
- - Sinensis fructu magno oblongo.
- - Sinensis fructu magno rotundo.
- - Sinensis fructu paruo.
- - Fructu Quercino.

MALVS AVRANTIA, Pomum Adami.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Orientale.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Orientale folio crispo.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Occidentale.

- - Triplici fructu, Clemaat Batauis dicta, Kloster Apfel.

MALVS LIMONIA Fructu pusillo dulci. Limonetto dulce.

- - Fructu pusillo, dulcis Romana.

- - Fructu maiore dulci.

- - Fructus Cortice crasso.

- - Fructus Cortice tenui.

- - Fructu mucronato.

- - Pyri effigie, Spadafora.

- - Fructu digitato: Zatella.

- - Aurantio praegnans, Bizaria; Limonium foetiferum.

- - Fructu Cucumerino.

- - Fructu Pyri minore, Peretta.

- - Fructu Pyri maiore, Bergamotto.

- - Fructu Verrucoso: seu scabiosa.

- - Fructu Cucurbitaceo, Zuchetta.

- - Pomum Adami seu Lima acida maior.

- - Pomum Adami fructu saturate luteo.

- - Pomum Paradisi.

- - Pusilla Pila.

- - Romana.

MA-

MALVS LIMONIA, Pusilla Calabriae
fructu acido.

- - Fructu magno dulci folio variegato.
- - Salicis folio.
- - Lauri folio.
- - Latifolia serrata.
- - Fructu inaurato.
- - Fructu quercino.
- - Folio inaurato, Geel op het blaet.
- - Fructu monstroso, Florentina.
- - Hispanica, di Spagna.

MALVS LIMONIA di Gallicia.

- - di Valencia.
- - Flore pleno.
- - Flore rubente.
- - Spadafora Grande.
- - Spadafora Regina.
- - Grobolosa.
- - Ligustica.
- - Montana, Laura Gentile.
- - Spongino di Spagna:
- - Palladina della gran sorte.
- - Pontina di Spagna Piccola.
- - Straparente.
- - Gout Limonia.
- - Salerno di Genoua.
- - Salerno Monstroso.
- - Citrata parua: Cedro Piccolo.
- - Citrata fructu longo maximo: Cedro grosso Pondeloto.

MA-

MALVS LIMONIA Citrata fructu rotundo maximo.

- - Citrata fructu monstroso.
- - fructu Moschato.
- - Fructu mucronato.
- - Barbarina. Cedrato Barbarino.
- - Citrea Syluestris.
- - Citrea Medulla acri.
- - Medulla dulci.

MARRVEIASTRVM Cardacae folio.

- - Hispanicum calyce stellato.

MARRVBIVM foliis sericeis argenteis.

MARVM, Syriacum.

- - Hispanicum, nigrum, fruticans, odore minus acuto, flore purpurascente.

MASTICHINA.

MEDICA, marina.

MEDICAGO, trifolia, frutescens, incana; Medica.

MELIANTHVS, maior.

- - minor, foetens.

MELOCACTVS, Americana, minor, lactescens.

MESPILVS, Apii folio, laciniato; Aro-nia.

MILLEFOLIUM, flore luteo.

- - nobile.

MIMOSA, folio Sennae, lato, spinosa,
Aeschynomene spinosa, latifolia.

- - maior, frutescens, spinosa; Sensitiva
maior, siue Aeschynomene.

- - spuria de Phernambuc; Mimosa Ita-
lica.

MITELLA, Americana, florum albidis
petalis, fimbriatis, Cortusae simi-
lis.

MOLDAVICA, Americana, trifolia, o-
dore graui; Cedronella Canarien-
sis.

MOLLE.

MVSA, fructu cucumerino, longiori.

MYRRHIS, Sicula, elatior, tenuiori-
bus foliis; Chaerophyllum ficulum
sophiae folio, villoso semine.

MYRTVS, communis, Italica.

- - folio odore Citri, cauliculis rubenti-
bus.

- - foliis latioribus, Romana.

- - angustifolia, Baetica.

- - foliis latioribus, flore pleno.

- - minor, vulgaris siue Tarentina.

- - foliis minimis et mucronatis.

- - foliis mucronatis, ex albo et viridi
variegatis.

- - Balsamica foliis mali Granati, foliis
quandoque ternis.

- - Buxi folio.

N.

NARCISCVS, maritimus.

NERIVM, floribus rubescentibus; Rhododendrum.

- - flore simplici, albo.
- - Indicum, latifolium, flore variegatō, odorato, pleno.
- - angustifolium flore carneo odorato.

OENANTHE Myani.

- - Apii folio.

OLEA, fatiua, domestica.

OPVNTIA, maxima, folio spinoso, latissimo, longissimo.

- - maior, spinis validissimis, flavescentibus munita; Tuna.
- - quae Tuna elatior, spinis validis nigricantibus.
- - vulgo Herbariorum.
- - Curassauica, minima.

PALIVRVS.

P.

PALMA, dactylifera, maior.

- - dactylifera, folio flabelliformi, humilis, non spinosa.
- - maior, dactylifera, folio flabelliformi, pedunculo ad latera durissimis magnisque spinis armato.

PAL-

PALMA foliis longissimis, pendulis, absque villo pedunculo, ex caudice glabro enatis; Draco arbor.

PARONYCHIA Hispanica.

PERICLYMENVM, Virginianum, semper virens, et florens.

- - Virginianum, foliis variegatis.

PERIPLOCA, foliis oblongis.

- - Monspeliaca, foliis acutioribus; Apocynum scandens, Scammonii facie, amplexicaule.

- - Africana, foliis oblongis, angustis, flore luteolo.

PHALANGIVM, Africanum, foliis cepaceis, floribus spicatis, aureis; Aloe falso dicta.

- - Africanum, foliis Ficoidis, floribus spicatis, aureis.

PHASEOLVS, Africanus, perennis, cochleato flore, Caracalla dictus.

- - Africanus, Tamarindi foliis, qui Abrus dicitur, fructu coccineo, hilo nigro.

- - Indicus, perennis, floribus purpurascens.

PHILLYREA, folio Ligustri.

- - angustifolia prima.

PHLOMIS, fruticosa, Salviae folio, latiore, flore luteo; Salvia fatua.

PHYTOLACCA, Americana, fructu minori

nori; *Amaranthus baccifer*, *Circaea folio*.

PIMPINELLA, spinosa, semper virens.

PINVS, sativa.

- - *Siberiensis*.

PLUMBAGO, *Ceylanensium*, folio splendente, *Ocymastri flore lacteo*.

POLIVM, montanum, luteum, magis odorum.

- - montanum, repens, incanum, flore purpurascens.

PSEUDO *Acacia Virginiana*, non spinosa, nomine missa; *Amorpha Linnaei*.

PSEUDO-DICTAMNVS, verticillatus, inodorus, maior.

- - *Hispanicus*, amplissimo folio, candicante, et villosus.

PVNICA, quae malum granatum fert.

- - seu granatus, flore pleno, maiore; *Balaustia*.

PYRETHRVM.

R.

RAPUNTIVM, maximum, coccineum, spicato flore; *Flos Cardinalis*, flore Kermesino.

- - *Americanum*, flore dilute coeruleo; *Rapunculus*.

RHABARBARVM crispum *Muntingii*.

RHAMNVS cortice albo angustifolius.

C

RHA-

RHAMNVS spinis oblongis, cortice albo, Monspeliensium.

RHAMNI prima altera species.

RICINVS, minor, perennis, Americanus.

ROSMARINVS hortensis.

- - striatus, siue aureus.

- - hortensis, angustiore folio, argenteus.

RUBVS flore pleno.

RUSCVS, angustifolius, fructu folio innascente.

- - Latifolius, fructu folio insidente; Laurus Alexandrina.

- - angustifolius, fructu summis ramulis innascente; Laurus Alexandrina.

- - myrtifolius, aculeatus.

RVTA, Chalepensis, latifolia, villosis petalis.

- - hortensis, minor, tenuifolia, foliis variegatis, argenteis.

SALICASTRUM Buxbaumii.

SANTOLINA, foliis teretibus; Abrotanum, foemina, flore sulphureo.

- - flore maiore, foliis villosis, et incanis.

- - foliis, obscure virentibus, asperioribus, flore aureo.

SATVREIA spicata, siue S. Iuliani quorundam; Tragoriganum.

SAVRVRVS, repens, lanceolatus; Serpen-

pentaria repens, Bryoniae nigrae
folio ampliore, pingui, Virginiana.

SCABIOSA, Africana frutescens, foliis
crenatis, flore pallido, coeruleo.

- - perennis flore sulphureo.

SCILLA, vulgaris, radice rubra.

SCLAREA, folio triangulari, caule to-
mentoso.

- - Indica, arborescens, calyce campa-
nulato, flore pulchro aurantio, Leo-
nuri maioris simili Horti Walthe-
riani.

- - Syriaca flore albo.

SCROPHULARIA, Hispanica, Sambuci
folio, glabro, flore viridi, et phoeni-
ceo magno.

- - Ruta canina dicta.

- - Pyrenaica.

SEDUM, maius, arborescens.

- - foliis variegatis.

- - Canarium, foliis omnium maximis.

- - Africanum, frutescens, folio longo,
ferrato, confertim nato,

- - montanum, tomentosum, gnaphaloi-
des.

- - minus a rupe S. Vincentii; rupestre
repens.

- - Afrum, saxatile, foliolis Sedi vulga-
ris, in rosam vere compositis; Cras-
sula orbicularis, repens, folio Sem-
peruiui.

SEDUM Africanum, humile, Ficoidis folio; Crassula caesposa, longifolia.

SENECIO, Africanus, frutescens, folio retuso; Conyza Africana.

- - Africanus, arborescens, folio ferrato.

- - Africanus, arborescens, folio ficoidis.

SESBAN Alpini.

SIDERITIS, Alpina, hyssopifolia.

- - Orientalis, Phlomidis folio.

SILIQVA, edulis.

SILIQVASTRUM, arbor Iudae.

SMILAX, aspera, fructu rubente.

- - quodammodo spinosa, fructu nigro.

- - non spinosa.

SMYRNIVM Matthioli.

SOLANVM, scandens, foliis ex albo variegatis, flore coeruleo.

- - pomiferum, frutescens, spinosum, Africanum, flore Borriginis, folio Quercus, profunde laciniato.

- - pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio incano, caule spinoso, fructu rotundo.

- - molle, foliorum nervis et aculeis flavescentibus, fructu mammoso.

- - pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio, et caule spinoso; magis viridi.

- - fruticosum, bacciferum; Amomum Plinii Strychnodendron.

SOLANVM scandens flore albo.

SPHON-

SPHONDILIVM angustifolium Panax
Heracleonis.

- - angustifolium.

STACHYS, Lusitanica, frutescens maior;
Teucrium Regium.

- - Canariensis, frutescens, verbasci fo-
lio, flore albo.

STOECHAS, purpurea, Arabica.

- - Folio ferrato.

SVBER latifolium, perpetuo virens;
Phellos.

T T.

TAMARISCVS Germanica.

- - Narbonensis.

TANACETVM, Africanum, arborescens,
Lauendulae multifido folio.

TAXVS sylvestris.

TELEPHIOIDES Legitimum Impe-
rati.

TEREBINTHVS; Pistacia vera.

- - vulgaris, mas.

TETRAGONOCARPVS, Africanus,
fruticans, folio angusto.

TEVCRIVM, calice tubulato, flore lu-
teolo.

- - Baeticum, calyce campanulato.

THAPSIA Canadensis lutea.

THLASPIDIVM, fruticosum, folio Leu-
coii, semper florens.

- - Persicum, folio ex viridi et aureo va-
riegato.

THYMVS, moschatus, vulgari duriori similis; Serpillum moschatum.

TINVS, prior Clusii.

TITHYMALVS, Characias, amygdaloides; Characias.

- - Indicus, frutescens, ramosissimus, pene aphyllus.

- - Indicus frutescens.

- - aphyllus Mauritaniae, Imper.

- - maritimus, angustiore Anacampserotis folio, in spinam breuissimam desinente.

- - Orientalis, Anacampserotis folio, flore magno, cristato.

TOXICODENDRON, trifoliatum, rectum, foliis minoribus.

TRAGACANTHA.

TRIFOLIUM, bitumen redolens.

TULIPIFERA, arbor Virginiana.

V.

VERONICA Americana erecta frutescens.

VIBURNUM, Americanum, odoratum, folio Vrticae, floribus miniatis.

VITEX, foliis angustis, cannabis modo dispositis, flore coeruleo.

- - siue agnus castus.

- - trifolia, maior, Indica, serrata.

X.

XYLON, arboreum; Gossypium frutescens.

Y.

YVCCA, folio aloes.

- - Americana caulescens altissima arboris draconis folio.

Z.

ZINGIBER, latifolium, sylvestre.

ZIZIPHVS.

ZYGIS serpillum tomentosum.



CLASSIS SECVNDA
PLANTARVM
 PERENNIVM.

A.

ABROTANVM.

- - campestre cauliculis rubentibus.

ABSINTHIUM, vulgare, latifolium.

- - insipidum.

- - Ponticum, tenuifolium, incanum.

- - marinum, album; Seriphium Belgicum.

ACANTHVS aculeatus.

ACETOSA, maior, pratensis.

- - Hispanica, maxima.

- - rotundifolia, hortensis.

- - foliorum luteolis venis.

- - maior, lanceolata.

- - minor, lanceolata.

- - pratensis folio crispo.

ACONITVM, luteum, lycoctonum, maius; Napellus.

- - idem, flore pallidiore, luteo.

- - salutiferum; Anthora.

- - flore coeruleo; Napellus, flore maiore.

ACORVS, siue Calamus aromaticus.

ADI-

ADIANTHVM album.

ADONIS, Hellebori radice; Helleborus Hippocratis, flore luteo; Pseudo-Elleborum.

AGERATVM, quod Eupatorium Mesue.

AGRIMONIA, odorata; Eupatorium odoratum.

- - vulgaris.

- - minor, flore albo.

AIVGA.

ALCEA, vulgaris, flore roseo.

- - vulgaris, candidiore flore.

- - cannabina, fruticosa;

- - Thuringiaca, folio molli, flore maiori roseo.

- - Virginiana; Abutilon, vel Althaea Ricini folio.

- - hortensis vitis folio.

ALCHIMILLA, maior.

- - minor, perennis, alpina.

ALISMA.

ALKEKENGİ.

ALLIVM, sativum.

- - alterum, caulis summo in circulum conuoluto; aliis Serpentinum dictum.

- - vrsinum, latifolium, sylvestre.

- - angustifolium, montanum, bicornе.

- - pratense.

- - angustifolium, caule folia perforante, vitigineum.

ALSINE, memorum altissima.

- - pratensis, gramineo folio, ampliore.

- - pratensis, gramineo folio, angustiore.

ALTHAEA, vulgaris, folio molli, flore carneo.

- - purpurascente flore.

ALYSSVM fruticosum incanum Thlaspi Mechlinense.

AMMI, perenne; Falcaria.

ANACAMPSEROS seu Fabaria, flore albo.

- - seu Telephium, radice rosam spirante.

- - minor; Sedum.

- - flore purpureo.

ANAGALLIS, lutea memorum.

ANDROSAEMVM, foetidum, maximum, frutescens; Siciliana.

ANEMONE, montana, flore albo, maior sylvestris.

- - hortensis; et variae eius species.

ANEMONOIDES, flore albo; Ranunculus.

- - seu Nemorosa, flore incarnato; Ranunculus.

- - flore pleno, purpurascente.

- - flore luteo, unico.

- - flore luteo, bino, et terno; Ranunculus.

ANEMONOIDES flore albo, pleno.

ANGELICA, fatiua.

- - pratensis minor.

- - syluestris, maior, minoribus foliis.

- - syluestris, repens; Podagraria.

ANONIS, spinosa, flore purpureo, vulgaris.

- - spinosa, flore albo.

- - spinis carens, floribus candidis.

- - spinis carens, flore purpureo.

ANTIRRHINUM, maius, flore rubro, rictu luteo.

- - flore albo, rictu luteo.

- - flore carneo, rictu aureo.

APIOS, Americana; glans terrestris.

APIUM, tenuifolium,

- - folio crispo.

- - fatium.

- - dulce; celeri Italorum; apium.

- - Macedonicum.

- - Folio subrotundo.

APOCYNUM, Americanum, aut Syriacum maximum, latifolium, glomeroso flore roseo, odorato, in umbella.

- - erectum, Canadense, angustifolium, flore rubro.

AQVILEGIA hortensis flore coeruleso pleno.

- - hortensis flore coeruleso in albo variegato.

AQVI-

AQVILEGIA hortensis flore pallide coeruleo pleno.

- - hortensis flore albo pleno.

- - hortensis flore rubro pleno.

- - hortensis flore violaceo in albo variegato pleno.

- - hortensis flore rubro in albo variegato pleno.

- - hortensis flore cinereo simplici.

- - hortensis flore rubro simplici.

- - hortensis flore albo simplici.

- - hortensis flore coeruleo simplici.

- - stellata flore rubro pleno, -

- - stellata flore albo pleno.

- - stellata flore coeruleo pleno.

- - stellata flore purpureo pleno.

- - stellata flore albo simplici.

- - stellata flore rubro simplici.

- - pumila, praecox, Canadensis.

ARISTOLOCHIA, longa.

ARTEMISIA, caule rubro.

- - flore variegato.

- - caule, ex viridi albicante.

ARVM vulgare non maculatum.

- - maculatum maculis nigris.

- - venis albis.

ARVND variegata.

- - vulgaris Phragmites.

ASARVM.

ASCLEPIAS flore luteolo.

- - flore albo; Vincetoxicum.

ASCLE

ASCLEPIAS, seu Vincetoxicum, flore nigro.

ASCYRVM, magno flore; Androsæmum maximum, bacciferum.

ASPARAGVS, hortensis.

ASPHODALVS, flore luteo, folio fistuloso.

ASPLENIVM, seu Ceterach.

ASTER, qui Helenium vocatur.

- - nouae Angliae, flore purpureo-vio-
laceo.

- - noui Belgii, umbellatus.

- - folio salicis, hirsuto, flore luteo, Au-
striacus.

- - folio glabro, salicis, flore luteo;

- - Atticus, flore coeruleo.

- - folio salicis, angustiore; Austriacus.

- - flore albo, specioso, folio angusto; an-
ferotinus, procerior, ramosus, belli-
dis syluestris flore.

- - Americanus latifolius puniceis cau-
libus.

ASTERISCVS, folio angusto, aspero, ob-
scure viridi, non ferrato; de reliquo
similis Asteri IV. Austriaco.

ASTRAGALVS, folio subdulci.

- - Orientalis altissimus, folio Galegae,
flore paruo, flauescente, siliqua
curta;

- - purpureus, Monspeliacus.

- - repens, siliqua curta, tenuiore folio,
flore

flore ex coeruleo purpurascen-
te.

ASTRAGALVS repens, filiqua curta;
Glaux, flore ochroleuco.

- - luteus, perennis, filiqua gemella, ro-
tunda, vesicam referente.

ASTRANTIA.

BALLOTTE. B.

BALSAMITA, quae Mentha Saracenica,
et Graeca.

BELLADONNA, Solanum maius.

BELLIS hortensis flore rubro multipli-
ci fistuloso H. R. Par.

- - flore pleno magno ex candido et ru-
bro vario.

- - fyluestris minor flore misto.

- - horrensis flore pleno magno vel par-
uo albo.

- - flore carneo toto fistuloso.

- - flore carneo radio tantum fistuloso.

- - flore albo radio fistuloso.

- - Prolifera variegata.

BETONICA, Danica, siue maior ramosa,
flore albo.

- - Orientalis folio longissimo.

- - purpurea, vulgaris.

- - flore carneo.

- - flore variegato.

BISTORTA, maior.

BLATTARIA, flore albo, extus violaceo.

BLAT-

BLATTARIA flore luteo, rugoso, verba-
fei folio.

- - nigrae violae flore.

BRVNELLA, flore magno, coeruleo.

- - folio non dissecto, flore albo.

- - folio laciniato, flore purpureo.

BRYONIA, alba.

- - baccis nigris.

BVGLOSSVM, sylvestre, angustifolium.

- - sylvestre angustifolium, flore albo.

- - maiore flore, coeruleo, diluto.

- - latifolium, flore minori borraginis;
Borrago, semper virens, maior.

- - montanum, flore atropurpureo.

BVGULA, montana, villosa, flore coeru-
leo pallidior.

- - flore coeruleo.

- - flore albo.

- - sylvestris, flore suauerubente.

BVPHTHALMVM, tanaceti minoris fo-
lio, flore aureo; Bupthalmum
Chrysanthemo congener.

- - seu Leucanthemum vulgare.

BVPLEVRVM, folio angustiore.

- - latifolium.

BVTOMVS, flore roseo; Iuncus floridus.

C

G.

CACVEALVS.

CALAMINTHA, vulgaris.

- - montana folio aureis maculis notato.

- - magno flore.

CAME-

CALCEOLVS Mariae.

CAMERARIA, Alfine fluuiatilis.

CAMPANULA, Persicae folio, angusto,
flore coeruleo.

- - Persicae folio, flore coeruleo, pleno.

- - horrensis folio et flore oblongo : vio-
la mariana Dodonaei.

- - Persicae folio, angusto, maior, flore
albo.

- - Persicae folio, angusto, flore albo,
pleno.

- - radice esculenta.

- - quae Rapunculus.

- - sylvestris, inferius fere rotundifolia.

- - maxima, foliis latissimis, flore coeru-
leo.

- - maxima, foliis latissimis, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo.

- - folio vrticae, maiore, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo
pleno.

- - folio vrticae, maiore, flore albo, ple-
no.

- - conglomerata, Pratenfis; Trache-
lium, flore pallido, coeruleo.

CAPNOIDES, flore purpureo et luteo;
Pseudo-fumaria Indica.

CARDAMINE, flore maiore, elatior;
Nasturtium aquaticum, maius, et
amarum.

CARDIACA, flore albo.

- - flore roseo, pallido.

CAR-

CARDIAGA crispa.

CARDVVS, tomentosus, Acanthi folio, altissimus, Lusitanicus.

- - nemorum altissimus; Cirsium.

- - scolymus sylvestris.

CARLINA, acaulos.

CARYOPHYLLATA, vulgaris.

- - vulgaris, folio variegato.

- - Alpina, aureo flore magno.

- - capite nutante, aquatica.

- - montana, flore luteo, nutante.

CARYOPHYLLVS, plumosus, sylvestris, flore albo.

- - barbatus, sylvestris, flore rubro, pleno.

- - barbatus idem, vel Carthusianorum flos simplex, aut armerius.

- - sylvestris, flore purpureo.

- - sylvestris, siue tunica sylvestris minima.

CASSIDA, Lamii folio, flore ex parte purpurascens, vel exalbido.

- - vulgaris; Scutellaria.

CATARIA, maior, vulgaris; Nepeta.

CEPA.

- - vulgaris rotunda alba.

- - vulgaris longa.

CENTAVRIVM, maius, Orientale, erectum, glastifolium, flore luteo.

CHAEROPHYLLVM, palustre, latifolium, flore albo; Myrrhis palustris.

D

CHAE-

- CHAEROPHYLLUM, flore rubello.
- CHAMAECLEMA, Hedera terrestris.
- - folio variegato.
- CHAMAEDRYS, maior, repens.
- - minor, repens.
- - multiflora, repens, Hispan. folio pulchre laciniato, flore albido, facie Teucrit Orientalis.
- CHAMAEMELUM, Romanum, sine nobile.
- CHAMAENERION, quod Lyfimachia speciosa.
- - aquaticum, filiquosum, hirsutum, flore magno; Lyfimachia.
- - glabrum; Lyfimachia purpurea, filiquosa, an filius ante patrem.
- CHELIDONIVM.
- - foliis, et floribus valde laciniatis.
- CHONDRILLA, sonchi folio, flore purpurascens.
- - sonchi folio flore luteo.
- CHRISTOPHORIANA.
- CHRYSOSPLENIVM; Saxifraga aurea.
- CICHORIVM.
- - flore albo.
- - flore roseo.
- - hortense: Endiuvia.
- - folio crispo.
- CICVTARIA latifolia foetidissima.
- CINARA.
- - hortensis, aculeata.

CIRCAEA, Lutetiana.

CIRSIVM maximum incanum bulbosa
radice Clus.

- - maius singulari capitulo magno vel
incano varie dissectum.

- - flore purpureo.

- - flore albo.

- - acaule, flore purpureo; Carduus
acaulis.

- - pratense, foliis latioribus, diuisis, vi-
ridibus, floribus flavescentibus, in
capite folioso.

- - Lactucæ folio.

- - Caule alato.

CISTVS, folio Rorismarini latiore; Le-
dum Silesiacum.

CLEMATITIS; Flammula surrecta, al-
ba; Flammula altera.

- - Pannonica, erecta, flore violaceo.

- - scandens, folio laciniato, flore coe-
rulescente.

- - flore coeruleo, pleno.

CLINOPODIVM, vulgare.

COCHLEARIA, folio cubitali; Armo-
racia vulgaris.

COLCHICVM vulgare.

- - vulgare purpurascens flore.

- - candidum multiflorum.

- - pleno flore variegatum.

- - pleno flore striatum.

CONVALLIVM flos: Lilium Con-
uallium

uallium foliis ex aureo et viridi striatis.

- - Coma aurea.

CONVALLIVM flos hortensis latifolius flore magno.

- - latifolius sylvestris.

- - flore rubente.

- - flore ex rubro striato.

CONVOLVVLVS minor aduersis flore roseo.

- - maior flore albo.

CONYZA, Pyrenaica, flore aureo, foliis rugosis Primulae veris.

CORONA IMPERIALIS, vulgaris.

- - folio argentato. Vid. Catal. Florum.

CORONA SOLIS, altissima, Virginiana; Chrysanthemum angustifolium, viride.

- - paruo flore, radice tuberosa, esculenta; Chrysanthemum.

- - foliis amplioribus, laciniatis; Doronicum Americanum maius.

- - foliis angustioribus, laciniatis.

- - quae Chrysanthemum Americanum, perenne latifolium.

CORONILLA, flore vario, herbacea.

CRACCA, syluatica, maior, perennis.

- - angustifolia.

CRAMBE, Orientalis, dentis leonis folio, Erucaginis facie.

CRO-

CROCVS, autumnalis, flore coerule-
scente, satiuus.

- - flore pallido, purpureo.

CROC1 verni diuersae species, flore albo,
luteo, coeruleo, et violaceo.

CRVCIATA, hirsuta flore luteo.

- - alpina latifolia laeuis.

CVCVBALVS Plinii.

CVCVLI Flos, Roseus; Lychnis praten-
sis, flore laciniato.

- - Flos, plenus, purpureus; Lychnis.

- - Flos, albus; Lychnis.

- - Flos, plenus, albus; Lychnis.

CYANVS montanus, latifolius, maior.

CYMBALARIA.

CYNOGLOSSVM montanum maxi-
mum.

- - maius, vulgare, flore rubro.

- - maius, vulgare, flore albo, monta-
num.

- - medium, Apulum, argenteum, cam-
pestre; Creticum.

- - Orientale, Buglossi folio, semine vm-
bilitato, cristato.

CYPEROIDES maius angustifolium.

- - angustifolium spicis longis erectis C.
B. P.

CYPERVS, rotundus, angustifolius, escu-
lentus.

- - rotundus, inodorus, Germanicus.

DENS CANIS, flore rubro.

- - flore carneo.

- - flore albo.

DENS LEONIS; Taraxacum.

- - qui Pilosella maior, repens, hirsuta.

- - qui Pilosella maior, repens, minus hirsuta.

DIGITALIS, flore rubro.

- - flore albo.

- - flore albo, punctis internis, purpureis, maioribus.

- - flore ferrugineo, latifolia.

- - flore luteo, magno.

- - flore luteo, minore.

- - minima; Gratiola, flore albo.

DIPSACVS, sylvestris, aut virga pastoris maior.

- - foliis laciniatis.

DORIA; Solidago Saracenica; Virga aurea.

- - quae Iacobaea palustris.

DORONICVM, quod Arnica.

- - radice Scorpium.

- - alpinum minus.

DRACO herba; Dracunculus esculentus, hortensis.

DRACUNCVLVS.

DRYMOPOGON: Ulmaria foliis in longas spicas congestis.

E.

ECHINOPVS; Carduus Sphaerocephalus, flore albo.

ECHIVM, Scorpioides, flore coerulescens maiore.

ELICHRYSVM, vel Stoechas citrina.

- - Americanum, latifolium; Gnaphalium.

- - flore suauiter rubente.

- - montanum folio rotundiore candido.

EMPETRVM, fructu nigro; Erica Coris folio.

EPHEMERVM, Virginianum, flore coerulescens; Ephemerum phalangoides.

EPIMEDIVM.

EQVISETVM, palustre, brevioribus setis.

- - pratense.

ERICA, flore rubro.

ERVCA lutea latifolia siue Barbaraea C. B. P.

- - siue Barbaraea minor. Sisymbrium Erucæ folio glabro minus et præcocius T.

ERYNGIVM, campestre, vulgare.

- - montanum, latifolium, flore albo.

- - montanum amethystinum.

EVPATORIVM, urticae folio.

- - vulgare.

FERRVM Equinum, comosum, flore luteo.

FICARIA, quae Chelidonium minus.

- - flore pleno.

FILIPENDULA.

FILIX, ramosa, quae foemina.

- - non ramosa, mas.

- - petraea; Dryopteris.

FOENICULVM, dulce.

FRAGARIA, flore albo.

- - sterilis, sylvestris.

FRAXINELLA; Dictamnus albus.

- - flore pallente, folio angusto, minore;
minor, flore albo.

FUMARIA, bulbosa radice, caua, maior,
flore purpureo; Pseudo-fumaria.

- - bulbosa radice, flore albo.

- - radice non caua, flore purpureo.

- - radice non caua, flore albo.

G G.
GALEGA, flore coeruleo.

- - flore albo.

- - Africana, floribus coeruleis, maiori-
bus, siliquis crassioribus.

GALEOPSIS, flore luteo, foliis macula-
tis; Lamium.

GALLIVM, flore luteo.

- - flore albo.

GENTIANA, cruciata.

- - palustris, autumnalis; Pneumonan-
the dicta.

GEN-

GENTIANA palustris, lato plantaginis folio, flore coeruleo, punctato.

GERANIVM, batrachioides, flore violaceo.

- - batrachioides, flore albo.

- - batrachioides, odoratum, flore roseo.

- - batrachioides, folio Aconiti.

- - haematodes, supinum, radice reptante.

- - phaeum, petalis planis, fuscum, pullo flore.

- - Robertianum, murale, graeolens.

- - - - flore albo.

- - Lancastrense.

- - petalis planis flore nigro.

- - Aconiti folio floribus longiori pedunculo insidentibus.

- - Graeolens moschatum.

GEVM, folio rotundo, dentato; Umbilicus Veneris; Sanicula montana, folio rotundo.

- - folio rotundo, dentato, striis aureis interdistincto.

- - folio subrotundo, minori dentato, pistillo floris rubro.

GLADIOLVS, flore purpureo.

- - Flore albo, aliaeque species.

GLAVCIVM, Flore luteo; Papauer corniculatum.

GLAVX,maritima,Myrti Tarentinae folio.

GLOBVLARIA,Scabiosa minor.

GLYCYRRHIZA.

- - echinato capite;Pseudo-Glycyrrhiza.

GRAMEN,paniculatum, folio variegato, arundinaceum.

- - dactylon Orientale.

- - Gras Belgarum.

GRAMINVM syluestres variae species.
H.

HEDYSARVM, clypeatum, flore elegantissimo, rubro.

- - clypeatum, Flore albido.

- - Canadense.

HELIANTHEMVM.

HELLEBORINE,latifolia, barba rubra.

HELLEBOROIDES.

HELLEBORO-RANVNCVLVS, Flore globoso,luteo; Trollius ranunculus.

HELLEBORVS, niger, foetidus; Helleborastrum magnum.

- - hortensis, maior, Flore viridi; Elleborem nigrum.

- - hortensis, minor, Flore viridi.

- - Flore albo, vel roseo;

- - Flore roseo.

HEPATICA, Flore coeruleo.

- - pleno coeruleo.

- - trifolia, Flore coeruleo pleno.

- - Flore rubro.

HEPA-

HEPATICA, Flore rubro simplici.

- - Flore albo simplici;

HERNIARIA.

HESPERIS, hortensis, Flore purpureo, simplici.

- - hortensis, Flore purpureo, pleno.

- - hortensis, flore albo, pleno.

- - quae viola matronalis, flore albo, et purpureo, pleno, variegata.

- - montana, flore obsoleto, noctu olens.

- - Allium redolens; Alliaria.

- - quae Draba, flore albo.

HIERACIUM, Alpinum, latifolium, flore magno.

- - fruticosum, angustifolium.

- - murorum; Pilosella aliorum maior; Pulmonaria Gallorum.

- - hortense, floribus atro-rubentibus; Pilosella flammea, maior Syriaca.

- - umbelliferum; Pilosella maior, erecta.

- - Hirsutum umbelliferum maius.

- - Hirsutum, Pilosella ramosa.

HORMINUM, spurium; Gallitrichum.

- - foliis alatis, hirsutis, caule, et caliculis rubris.

- - verbenae laciniis.

- - Floribus ex albidis.

- - flore coeruleo.

HOTTONIA; Myriophyllum aquaticum.

HYA-

HYACINTHVS, stellatus, coeruleus,
amoenus.

- - Belgicus, flore carneo.

HYDROCOTYLE; Cotyledon aquaticus, acris septentrionalium.

HYDROPHYLLON; Dentariae affinis.

HYPERICVM, vulgare.

- - elegantissimum, non ramosum, folio punctato in margine.

- - minimum, supinum, glabrum.

HYSSOPVS, flore coeruleo.

- - flore albo.

- - flore carneo.

I.

IACEA, capite spinoso, folio multifido,
flore luteo.

- - Laciniata, Sonchi folio, capite spinoso, flore purpureo.

- - nigra, pratensis, latifolia.

- - purpurea, capite villosa, aspero;
Cyanus, capite reticulato.

- - flore purpureo, montana, maior, folio laciniato.

IACOBAEA, Sicula, facie Chrysanthemi.

IMPERATORIA.

IRIS Dalmatica maior flore, vulgari minus violaceo I. B.

- - humilis minor, flore purpureo barba violacea.

- - graminifolia flore pallide coeruleo.

- - flore atropurpureo.

IRIS

IRIS flore purpureo flauescente.

- - hortensis corona pallide coerulea,
barba purpurea striata.
- - humilis flore candido, Florentina dicta.
- - latissimo glauco folio flore luteo, barba albida.
- - humilis flore saturate violaceo.
- - Latifolia flore coeruleo.
- - flore albo barba coerulea.
- - hortensis flore obsoleto, barba coerulea.
- - angustifolia flore purpureo.
- - hortensis versicolor.
- - maior Latifolia, surrectis foliis floris
flauis & purpureis lineis distinctis.
- - hortensis alba Germanica C. B. P.
- - media, longissimis foliis lutea.
- - latissimo glauco folio flore toto pallide coeruleo.
- - media foliis in flore surrectis albis
barba coerulea albo striata.

L L.
LAMIVM, flore albo, non foetens.

- - Flore purpureo, non foetens.
- - Flore carneo.

LAPATHVM montanum, folio rotundo
neruis foliorum rubescentibus.

- - vinctuosum bonus Henricus.
- - Alpinum, folio subrotundo.
- - hortense, folio oblongo.

LA-

LAPATHVM aquaticum, folio cubitali,
Lapathum palustre.

- - hortense, folio magno, lato, subro-
tundo.

- - folio acuto, plano, siue Oxy-Lapa-
thum.

- - folio acuto, crispo.

- - acutum nervis folii rubentibus.

- - minimum; Hydro-Lapathum, mi-
nus.

- - folio superiori acuto, rubente.

LAPPA, quae Bardana maior.

LASERPITIM, Latifolium.

- - tenuifolium.

LATHYRVS, Narbonensis, Latifolius.

- - maiori flore, ex roseo violaceo; syl-
uaticus.

- - Aruenfis.

- - pratensis, flore luteo.

LAVENDVLA, Latifolia.

- - angustifolia.

LEPIDIVM, Piperitis.

- - folio magis serrato.

- - glastifolium.

LEVCANthemVM; Buphthalmus
aliorum; Bellis maior.

- - Tanaceti folio, semine umbilicato;
Bellis Tanaceti folio.

LEVCOIVM; Keiri, cuius species vid.
in Cat. Flor.

LIBANOTIS.

LIGVSTICVM, apii folio, vulgare ; Leuisticum.

LILIO-ASPHODALVS, luteus.

- - puniceus.

LILIO-FRITILLARIA; Lilium Perficum, aut Sufianum.

LILIO-NARCISSVS, Luteus, autumnalis, minor ; Narcissus ferotinus.

LILIVM, album.

- - folio inargentato.

- - album, flore pleno.

- - purpureo-croceum ; Hemerocallis.

- - floribus reflexis, pallide purpurascens, punctatis ; Martagon vulgare.

- - quod Martagon Constantinopolitanum, flore luteo ; Hemerocallis.

- - Byzantinum, miniatum.

LINARIA, Latifolia, Dalmatica, luteo, magno flore.

- - odorata, flore, ex coeruleo, purpureo, minore.

- - vulgaris, flore maiore.

- - flore pallido, luteo, minore, rictu aureo, Pannonica.

- - flore albo.

- - flore, ex coeruleo, et albo variegato, minore.

- - flore paruo, fere toto coerulescente, calcari breuiore.

LINOSYRIS: Passerina Tragi.

LIN-

LINGVA CERVINA; Phyllitis, vel scolopendrium.

- - angustifolia, lucida, folio ferrato; Hemionitis maior, crispa.

- - multifido folio.

- - quae Phyllitis undulata.

LITHOSPERMUM, perenne.

LOTUS, tetragonolobus, flore luteo.

- - flore maiore, luteo, aruensis.

LVNARIA, maior, siliqua rotundiore, flore albo.

- - flore coeruleo.

LVPVLVS, mas.

- - foemina.

LYCHNIS, coronaria, flore purpureo.

- - coronaria, flore rubro pleno.

- - coronaria, flore albo.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore coccineo, maior.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore incarnato, maior.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore candido, maior.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore pleno, miniato.

- - alba, multiplex.

- - sylvestris, alba, simplex.

- - sylvestris, purpurea, simplex.

- - purpurea, multiplex, aliorum Ocy-mastrum.

- - Ocy-mastri facie flore viridi.

LYCH-

LYCHNIS, sylvestris, quae Been album.

- - sylvestris, quae Been album, flore albo, pleno.

- - Suecica, calyce rotundo, amplissimo.

- - sylvestris, quae Saponaria.

- - quae Saponaria, flore pleno.

- - sylvestris, viscosa, rubra, angustifolia.

- - sylvestris, viscosa, rubra, flore pleno.

- - folio inferiori Bellidis, hirsuta, flore carneo; an noctiflora Dubracensis.

LYCOPODIVM.

LYCOPVS.

- - folio tenuiter secto.

LYSIMACHIA, lutea, maior, quadrifolia.

- - bifolia, aut trifolia; Blattariae affinis.

- - Ialappae folio.

- - angustifolia.

M **M.**
MAIORANA, perennis.

MALVA rosea folio subrotundo flore puniceo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore carneo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore purpureo relucente simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore albo fundo purpureo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore ex rubro nigricante simplici et pleno.

E

MAL-

MALVA rosea folio subrotundo flore purpurascens simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore roseo.

- - rosea folio subrotundo flore flavo fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore albo fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore luteo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore albo simplici et pleno.

MARRUBIUM, album, vulgare.

- - angustifolium.

- - Hispanicum candidum.

- - folio amplissimo.

MATRICARIA, flore simplici.

- - disco nudo.

- - flore simplici fistuloso.

- - disco fistuloso.

- - flore pleno.

MEDICA, maior, falcata, flore purpureo-violaceo; Foenum Burgundicum.

- - eadem foliis minoribus, flore ex viridi, et violaceo variegato.

- - falcata, maior, flore luteo.

MELILOTVS, fruticosa, lutea.

- - fruticosa, candida.

MELISSA, vulgaris.

- - Romana molliter hirsuta, et graecolens.

- - humilis, latifolia, maximo flore pur-

purpurascente; Melissophyllum.

MENIANTHES; Trifolium fibrinum.

MENISPERMUM.

MENTHA, crispa.

- - crispa, folio, ex aureo, et viridi variegato.

- - verticillata, latifolia, neque crispa.

- - folio angustiore, verticillata.

- - Aruensis, verticillata, hirsuta; Calamintha.

- - palustris, spicata.

MENTHASTRUM, Anglicum, niueum

- - Anglicum, foliis viridibus.

MERCURIALIS, perennis; Cynocrambe, foemina.

MEUM.

MILLEFOLIUM, flore purpurascente.

- - flore albo.

- - flore pallido.

- - vulgare, maius, album, foliis eleganter variegatis.

MOLLUGO, latifolia, montana, ramosa.

MOLY, Latifolium, Liliflorum.

MOSCHATELLINA; Ranunculus.

MVSCARI, obsoletiore flore, odoratissimo; Bulbus vomitorius.

- - flauo flore; Tibcadi.

- - coeruleum, maius; Hyacinthus, arbuteo flore, coeruleo.

MYRRHIS, tuberosa, semine minore, striato, leui; bulbosa.

MYRRHIS, odorata.

- - trilobata, Canadensis.
- - Podagrariae folio.

MYOSOTIS repens.

MYRTILLVS.

- - fructu rubro; Vaccinia rubra.
- - fructu albo; Vaccinium.

N.

NARCISSO-LEUCOIVM; Leuco-
ium bulbosum, triphyllum.

- - quod Leucoium bulbosum, vulgare,
hexaphyllum.
- - hexaphyllum, polyanthos.
- - hexaphyllum flore pleno.

NARCISSI diuersi, folio lato, flore, in
fastigio caulis, vno plerumque.

- - folio lato, fastigio caulis ferente plu-
res flores.
- - folio angusto Iunci.

Vid. Catal. Flor.

NVMMVLARIA, repens.

NYMPHAEA, flore albo.

- - maior.
- - alba, minima, quae morsus ranae.

O.

OENANTHE, triflora, aquatica, cau-
libus fistulosis.

OMPHALODES, Latifolia; Borrago mi-
nima.

ONAGRA, Latifolia.

ONO-

ONOBRYCHIS, maior, filiculis echinatis, cristatis.

- - filiculis, aculeis maioribus donatis.

OPHIOGLOSSVM.

OPHRYS, vel bifolium.

ORCHIS, vulgaris, flore purpureo.

- - vulgaris, flore albo, barba albicante.

- - spica purpurea, foetida.

- - spiralis.

OREOSELINVM, maius, Apii folio; Ceruaria.

- - minus, Apii folio.

ORIGANVM, vulgare, maius.

- - vulgare, minus, foliis, ex argenteo, variegatis, floribus pallidis, rubris.

ORNITHOGALVM, flore coeruleo, Hyacinthus stellatus.

- - Latifolium et maximum C. B. P.

- - angustifolium spicatum maximum.

- - floribus ex albo virescentibus.

- - spicatum album.

- - bifolium gramineum coeruleum.

- - umbellatum album medium latifolium C. B. P.

- - coeruleum Lusitanicum Latifolium Hyacinthus Peruvianus.

- - Luteum.

OROBVS, syluaticus, flore purpureo.

- - Viciae folio.

OSMVNDA Lunato folio; Lunaria botrydes.

OTITES.

OXYCOCCVS; Vaccinia palustris.

OXYs, flore albo.

- - flore Luteo; Trifolium acetosum.

- - flore rubello.

P.

PALMATA, ORCHIS, flore albo, folio maculato, viridi: Palmata.

- - flore diluto, purpureo, angusto folio maculato, obscuro.

PAPAVER, hirsutissimum, Orientale, flore maximo, puniceo.

PARIETARIA.

PARIS.

PARNASSIA; Gramen Parnassi.

PASTINACA, sylvestris.

- - sativa.

PENTAPHYLLOIDES, flore rubro, palustre; Pentaphyllum.

- - argenteum; Potentilla, vel Anserina.

- - supinum.

PERFOLIATA, montana, Latifolia.

- - montana rugo flore folio.

PERSICARIA, vulgaris, non maculosa.

- - maculosa.

- - vrens; Hydropiper.

PERVINCA, vulgaris, angustifolia, flore simplici, coerulescente.

- - vulgaris, angustifolia, flore albo.

- - vulgaris, angustifolia, flore pleno, rubro, coerulescente; Daphnoides.

PER-

PERVINCA, vulgaris, angustifolia, variegata ex argenteo et viridi.

PETASITES, maior, flore rubro.

- - maior, flore albo.

- - minor, tussilaginis anguloso folio.

PEVCEDANVM.

PHALANGIVM, non ramosum.

- - ramosum, maius, flore candido.

PELLANDRIVM.

PHYTOLACCA, Americana, fructu maiore; *Amaranthus baccifer*, aut *Solanum racemosum*, magnum, *Virginianum*, flore albo.

PIMPINELLA, spica breui, rubra; *Pimpinella*, siue *Sanguisorba maior*.

- - *Sanguisorba Italica*, foliis glabris; *Pimpinella* odore cucumeris.

- - *Agrimonoïdes*, odorata.

PLANTAGO, maior, *Latifolia*.

- - *Latifolia*, media.

- - *Lato*, sanguineo folio.

- - maior, angustifolia.

POEONIA, mas.

- - foemina.

- - mas, flore albo.

- - Folio maxime laciniato, Flore *Kermesino*, simplici.

- - foemina, flore pleno, rubro, maiore.

- - *Tenuifolia*, caesia; flore pleno, ex petalis latioribus, et angustioribus permistis, rubro.

POLEMONIVM, flore coeruleo; Valeriana Graeca.

- - flore albo.

POLYGALA, frutescens, folio buxi, flore maximo.

POLYGONATVM; Sigillum Salomonis Latifolium, vulgare.

- - maximum.

- - flore pleno.

- - angustifolium, non ramosum.

- - folio Veratri.

- - non ramosum.

POLYPODIVM.

POPVLAGO; Caltha palustris.

- - flore pleno.

PORRVM, commune capitatum.

POTAMOGETON, Latifolium.

- - Longo, serrato folio.

PRIMVLA VERIS, umbellata, odorata, pratensis, flore luteo.

- - umbellata, pallido flore, elatior, pratensis.

- - geminato flore, Aurantio.

- - Anglicana, flore luteo, pleno.

- - hortensis, umbellata, caule, et flore coccineo, folioso. Aliaeque species.

PSYLLIVM, maius, supinum, angustifolium, perenne.

PTARMICA, vulgaris. flore pleno.

PVLEGIVM, vulgare.

PVLEGIVM, angustifolium, ceruinum,
Citri odore.

PVLMONARIA, folio maculato, argen-
teo.

- - Vulgaris, latifolia, folio maculato,
et non maculato.

- - folio longiore, non maculato, flore
eleganti, e rubente coeruleo.

- - flore albo.

PVLSATILLA, tenuiore folio.

PYROLA.

Q.

QVINQVEFOLIVM, rectum lute-
um maius; Pentaphyllum.

- - maius, repens, Flore luteo.

- - rectum, caule rubro, hirsutius.

- - erectum, folio subtus argenteo.

- - minus, repens, vulgare.

- - minus, repens, luteum, flore tetra-
petalo; Tormentilla.

- - flore albo, montanum.

R.

RANUNCVLVS, pratensis, erectus,
acris.

- - pratensis, in foliis medio notatus ma-
cula nigra.

- - pratensis, erectus, dulcis.

- - pratensis, repens, hirsutus.

- - hortensis, inclinans, flore pleno.

- - magnus, valde hirsutus, flore luteo.

RANUNCULUS montanus, Aconiti folio, albus, flore minore.

- - folio Aconiti, flore albo, multiplici.
 - - pratensis, radice verticilli modo rotunda.
 - - bulbosus, flore pleno.
 - - nemorosus, vel syluaticus, folio subrotundo.
 - - rutae folio, flore pleno.
 - - aquaticus, folio rotundo, et capillaceo.
 - - aquaticus, capillaceus.
 - - aquatilis, albus, fluitans, Peucedani folio.
 - - Longifolius, palustris, maior.
 - - Longifolius, palustris minor.
 - - plantaginis folio Tournef. seu plantago aquatica.
 - - montanus folio incano illyricus.
 - - hortensis, et eius diuersae species.
- Vid. Cat. Flor.

RAPUNCULUS, corniculatus, flore albo.

- - corniculatus, capite globoso, coeruleo.

RESEDA, maxima.

RUBIA, tinctorum, fatiua.

- - sylvestris, Monspeffulana, maior.

RUBEOLA, sylvestris, quadrifolia, aspera.

- - quadrifolia, laevis, flore albo; Rubia.

RUSCUS myrti folio aculeatus.

R V S C V S Laurus alexandrina longifolia.
R V T A, latifolia.

S. **SAGITTA** latifolia, maior.

SALICARIA; *Lyfimachia purpurea* spicata.

SALVIA, vulgaris latifolia.

- - maior, folio, ex luteo, et viridi variegato.

- - Latifolia crispa.

- - minor aurita et non aurita.

- - flore albo.

- - carneo.

- - foliis angustissimis.

SANICVLA.

SAXIFRAGA, alba, capsula bicorni.

- - Sedi folio angusto, ferrato; *Sedum*.

- - foliis subrotundis, ferratis.

- - foliis ferratis in angulum acutum definentibus.

SCABIOSA, Alpina, folio Centaurii maioris, flore luteolo.

- - pratensis, hirsuta.

- - sulphurea perennis.

- - glabra, integro folio; *Succisa*.

- - flore cinereo, capitulo globofo, foliis in tenuissimas lacinias diuisis.

SCLAREA, maxima, vulgaris, flore coerulefcente.

SCLA-

SCLAREA, Aethiopica, Lanuginosa, incana, laciniato folio, flore albo.

- - glutinosa, flore luteo, quae Colus Iouis.

- - pratensis, foliis ferratis, flore albo; Salvia agrestis.

- - quae Horminum sylvestre, maius, flore albo, foliis integris.

- - pratensis, foliis ferratis, flore coeruleo; Horminum.

- - pratensis, flore suauerubente.

SCORDIVM.

SCORODOTIS, quae Salvia agrestis; Scorodonia.

SCORZONERA, latifolia, sinuata, hispanica.

- - latifolia, humilis, nervosa, pannonica.

SCROPHVLARIA, nodosa, foetida, flore atro-purpureo, punicante, folio obscuriore.

- - Pyraenaica vrticae folio.

- - Verbenae folio.

- - Betonicae folio.

- - Sambuci folio.

- - radice fibrosa; Betonica aquatica.

- - Melissae, aut Scorodoniae folio.

SEDVM, maius, vulgare.

- - tomentosum.

- - minus, luteum, Tamarisci folio.

- - teretifolium, esculentum; Semperuiuum.

SEDVM, paruum, acre; Semperuiuum
vermiculatum.

- - minus, vermiculare, nec acre.

SERPILLVM, vulgare, maius.

- - folio variegato.

- - odore Citri.

- - longiori, et tenuiori folio, sylvestre;
Zygis.

SERRATVLA, foliis minus profunde se-
ctis.

- - foliis profunde sectis.

SIDERITIS, vulgaris, hirsuta, erecta,
flore luteolo, galeae inferioris lim-
bo purpureo.

SILAVM; Sefeli pratense.

- - quod Angelica pratensis.

SISARVM.

SISYMBRIVM, aquaticum; Nasturtium
humile, aquaticum.

- - Orientale, facile Barbareae; folio
Plantaginis.

- - Erucae folio, glabro; Barbarea ma-
ior.

- - Erucae folio, glabro, vel Barbarea
minor.

- - quod Rapiſtrum aquaticum.

- - repens, folio Nasturtii, flore luteo;
Eruca.

SIVM, Latifolium, maximum.

- - aquaticum, foliis multifidis, longis,
ferratis; Cicutaria.

SIVM

SIVM, minus.

- - aromaticum; Sison.

SMILAX, laevis Monophylla.

SOLANVM, lignosum, scandens; Dulcamara; Vitis fyluestris.

- - tuberosum, esculentum; Arachidna.

- - tuberosum radice alba.

SONCHVS, hieracites, asper.

SPARGANIVM, ramosum.

SPHONDYLIVM; Branca vrsina.

SQVAMARIA Riuini: Anblatum T.

STACHYS, montana, lanuginosa.

- - palustris, angustifolia.

- - foetida, latifolia, fyluestris.

STATICE, Latifolia.

STELLARIA aquatica.

SYMPHYTVM, flore rubro.

- - flore albo.

- - flore ferrugineo.

T T.

ANACETVM, vulgare.

- - folio crispo.

THALICTRVM, Canadense, caule purpurascente, staminibus albis.

- - Canadense.

- - maius, florum staminibus purpurascentibus; Thalictrum flore incarnato.

- - montanum caulibus petalorum puniceis.

- - pratense latiore folio.

THA-

THALICTRUM Alpinum maius aquilegiae folio florum staminibus albis caule viridi.

- - aquilegiae folio florum staminibus purpureis.

- - aquilegiae folio florum staminibus viridibus.

- - maius siliqua angulosa: Thalictrum flore albo.

- - folio glauco.

- - pratense Rorismarini angusto folio.

- - humile.

- - flore magno.

THYMVS.

THYSSELINVM.

TITHYMALVS; Cataputia.

- - Latifolius, an Characias.

- - palustris, fruticosus.

- - Helioscopius; Esula Solifraga.

- - Pini, vel potius Linariae folio.

- - cyparissias, repens.

TRAGOPOGON, pratense luteum minus.

- - purpureo-coeruleum, Porri folio.

TRAGOSELINVM, maius, umbella candida.

- - maius, coeruleum.

- - minus; Pimpinella saxifraga, vulgaris Pimpinellae folio, minor.

- - quod Pimpinella, minor.

TRICHOMANES.

TRIFOLIUM, montanum, spica longiore, rubente.

- - pratense, purpureum.

- - album.

Tuliparum praecocium et ferotinarum plures species. vid. Cat. Flor

TVRRITIS, foliis inferioribus cichoraceis, hispidis; Brassica sylvestris.

TVSSILAGO, vulgaris.

- - folio serrato.

- - Rotundifolia minor montana alpina.

V

V.

VALERIANA, hortensis latifolia.

- - folio vario.

- - angustifolia.

- - palustris, minor; Phu minus.

- - marina, flore purpureo.

- - marina, flore albo.

VERATRUM, vel Helleborus albus.

VERBASCUM, magnum, latifolium luteum.

- - mas dictum, angustioribus foliis, floribus pallidis.

- - Lychnitis, flore albo, paruo.

- - nigrum, crispo, et sinuato folio, flore luteo.

- - nigrum, staminibus, in luteo flore, purpureis.

VERBENA, Americana, altissima, Vrticae foliis

foliis angustioribus, spicis brevioribus, floribus coeruleis.

- - Americana, Vrticae folio, floribus albidis.

- - vulgaris.

VERONICA maior latifolia, erecta.

- - spicata; longifolia spicata.

- - montana.

- - montana, angustifolia, minor.

- - mas, supina, et vulgatissima; Veronica.

- - maior, frutescens, altera; Veronica pratensis latifolia.

- - aquatica, maior, folio subrotundo: Beccabunga dicta.

- - aquatica, minor, folio subrotundo; Beccabunga minor.

VICIA, perennis, acutiori folio; Vicia sepium.

VIOLETA, flore coeruleo.

- - martia multiplici flore striato.

- - - - - purpureo.

- - flore coeruleo, pleno.

- - flore coeruleo, medio rubro.

- - flore albo.

- - Martia, inodora, sylvestris.

- - montana, lutea, grandiflora.

VIRGA AVREA, latifolia, flore minore.

- - Canadensis Vrticae folio.

- - Latifolia, flosculis minimis.

VIRGA AVREA, angustifolia, panicula speciosa, Canadensis, flosculis minimis.

- - angustifolia, minus ferrata.

- - Mexicana, Limonii folio, floribus vno versu dispositis; panicula laxiore et foliis minus crenatis.

VLARIA, pratensis.

VVLARIA.

VRTICA, vrens, maxima.

VVLNERARIA, rustica; Anthyllis leguminosa, flore luteo.

X.

XYRIS.

Y.

YVCCA, foliis Aloes.



CLASSIS TERTIA
ARBORVM
 ET
FRVTICVM SYLVESTRIVM.

A.

ABIES, taxi folio, fructu sursum spectante; Abies altera.

- - tenuiore folio, fructu deorsum spectante; Picea.

ACER, maius, montanum.

- - alterum, Platani folio.

- - minus, campestre.

ALNVS.

AMYGDALVS.

- - amara.

- - Indica, nana aliaeque species.

AQVIFOLIUM, seu Agrifolium.

ARMENIACA.

B.

BERBERIS dumetorum.

BETVLA.

BIGNONIA, Americana, fraxini folio, flore amplo, phoeniceo; Gelseminum clematites.

BVXVS, humilis.

- - arborescens.

C.

CAPRIFOLIUM; Periclymenum non
perfoliatum, Germanicum.

- - Italicum, perfoliatum.

- - Germanicum, flore rubello.

CARPINVS.

CASTANEA, maiore fructu, sativa.

- - sylvestris, minore fructu.

CERASVS, vel Cerasia.

- - flore pleno.

- - pumila.

- - racemosa; Padus.

CHAMAECERASVS, Alpina, fructu ge-
mino, rubro, duobus punctis nota-
to; Xylosteum, folio cerasi maiore.

- - Alpina, fructu gemino, nigro.

- - dumetorum, fructu gemino, rubro;
Xylosteum.

COLUTEA, vulgaris, flore puniceo.

- - flore phoeniceo.

CORNVS, mas.

- - foemina, Ossea dicta; Virga Sanguinea.

CORYLVS, sativa.

- - sylvestris; Nux Auellana.

- - Byzantina, altissima, et maxima.

CRATAEGVS, folio subrotundo; Me-
spilus, Alni effigie, Lanato folio,
maior.

CRA-

CRATAEGVS, Folio laciniato; Sorbus
terminalis.

CYDONIA, fructu maiore; - Cotonea
pyrus.

- - fructu minore; Cotonea malus.

- - angustifolia, vulgaris.

CYTISO-GENISTA, Scoparia dicta.

CYTISVS, Alpinus, latifolius, flore ra-
cemoso; Anagyris non foetida; La-
burnum trifoliatum.

- - montanus, glaber, nigricans, flore lu-
teo.

E.

E LAEAGNVS, angustifolius, fructu
paruo.

EMERVVS; Colutea Scorpioides, elatior.

ERICA, flore rubro.

EVONYMVS.

F.

F AGVS.

FRANGVLA.

FRAXINVS.

- - frugifera, foemina, floribus in lin-
guam auis excreſcentibus.

G.

G ENISTA, tinctoria; Geniftella non
spinosa.

- - vulgaris.

GENISTA SPARTIVM, maius, longioribus aculeis; Scorpius.

- - Spartium; Genistella spinosa.

GROSSVLARIA, fatiua; Vua spina.

- - spinosa, fructu obscure purpurascente aliaeque species.

HEDERA, arborea.

- - minor, quae Helix.

HIPPOCASTANVM.

IASMINVM luteum.

IVNIPERVVS, vulgaris, fruticosa.

- - vulgaris, arbor.

LIGVSTRVM.

- - folio variegato.

LILAC, flore coeruleo; Syringa coerulea, vulgaris; Lilac.

- - flore albo.

- - folio Ligustri, flore coeruleo; Lilac Persarum.

MALVS, hortensis.

- - sylvestris.

MESPILVS, Germanica, vulgaris.

- - folio laurino, maior.

MESPILVS, Apii folio, sylvestris; Oxyacantha; Spina acuta.

- - spinosa; Oxyacantha, flore pleno.

- - folio subrotundo, fructu rubro; Chaemaespilus.

MORVS, fructu nigro.

- - alba.

N N.
VX IVGLANS.

O O.
PVLVS.

- - flore globofo; Sambucus aquatica, polyanthos.

P.

PENTAPHYLLOIDES, rectum, fruticosum, flore luteo, Eboracense.

PERSICA, viridis, et alba.

- - flore pleno.

PHILADELPHVS; Syringa.

PINVS, sylvestris.

- - humilis, iulo purpurascence; Pinaster.

PLATANVS.

POPVLVS, alba.

- - nigra.

- - tremula, Lybica.

PRVNVS, vel pruneolus, aut Acacia spuria.

- - hortensis, flore pleno.

PRVNVS, hortensis, flore simplici, et
eius diuersae species.

PSEUDO-ACACIA, filiquis glabris.

PYRVS, hortensis.

- - sylvestris.

- - flore pleno aliaeque species.

- - Castaneae folio.

Q

VERCVS.

Q.

R.

RHAMNVS, catharticus; Spina infe-
storia.

RHVS, Virginianum, vel Sumach.

RIBES Sylvestris fructu acido minore.

- - bacca rubra.

- - bacca alba.

- - minor, fructu rubro.

- - bacca nigra.

ROSA, Lutea, simplex.

- - Lutea, multiplex.

- - Damascena.

- - campestris, spinosissima, flore albo,
odoro.

- - campestris, spinosissima, flore ex albo
et suauerubente variegato odoro.

- - alba, flore pleno.

- - rubra, multiplex.

- - Prouincialis, flore incarnato, pleno.

- - rubicunda, Saccharina dicta.

- - flore, ex rubro, nigricante, pleno.

- - flore magno, pleno, ex atro rubente

et

et pallide rubro variegato, ocysſime
marceſcente.

ROSA prae-neſtina, variegata, plena.

- - ſylueſtris, incarnato flore.

- - multiplex, media, centifolia.

- - Prouincialis, flore pleno, atro-pur-
pureo.

R V B V S, vulgaris, fructu nigro.

- - repens, fructu caeſio.

- - Idaeus, fructu albo.

- - Idaeus, fructu rubro.

S.

SABINA, folio Tamarifci, mas di-
cta.

- - folio Cypreſſi.

SALIX, alba, arboreſcens.

- - Lutea, fatiua, folio crenato.

- - humilis, repens.

- - paluſtris.

- - vulgaris.

- - anguſtifolia.

SAMBVCVS, vulgaris.

- - fructu albo.

- - racemofa, fructu rubro.

- - Laciniato folio.

- - humilis; Ebulus.

SOLANVM, lignoſum, ſcandens; Dulca-
mara; Vitis ſylueſtris.

SORBUS, domeſtica.

- - Aucuparia.

SPIRAEA.

- - Hypericonis folio, non crenato; Hypericum arborescens.

STAPHYLODENDRON; Pistacia.

- - sylvestris.

T

T.

TAXUS.

THUYA; arbor vitae.

THYMELAEA germanica, Lauri folio, deciduo, flore purpureo; Laureola.

TILIA, foemina.

- - mas.

TOXICODENDRON, triphyllum, glabrum; Vitis canadensis trifolia.

- - folio sinuato, magis glabro, ceteroquin simile praecedenti.

V

V.

IBURNUM.

VITIS Canadensis quinquefolia.

VLMS.

X

X.

XYLOSTEUM bacca duplici.

- - fructu cerasi.



CLASSIS QVARTA
P L A N T A R V M
A N N V A R V M.

A.

ABVTILON.

- - Americanum, reptans, flore giluo;

ACETOSA, Americana, foliorum longissimis pediculis; **Acetosa** vesicaria.

- - Ocymi folio, Neapolitana.

ACINOS; Clinopodium aruense, Ocymi facie.

ACRIVIOLA, maxima, odorata, flore Aurantio.

- - flore sulphureo.

- - flore paruo.

ADONIS, hortensis, flore minore, atro rubente.

- - syluestris, flore phoeniceo, folio longiori.

AGERATVM, laciniatis foliis, inodorum, Africanum; **Elichrysum** inodorum glabrum.

ALCEA, flore albo, moschato, maiori.

ALCHIMILLA supina gramineo folio.

ALKEKENGİ, Indicum, maius; Solanum Halicacabum Indicum.

- - Indicum, minimum, fructu virescente.

- - Indicum, glabrum, capsici folio, calyce, quinque striis ex nigro purpureis, in angulis notato.

- - Americanum maximum villosum.

ALSINE, minor, multicaulis.

- - petalis quinque integris, equiseti folio; Spergula maior.

- - tetrapetalos, minima, glabra, Alsinella.

- - tetrapetalos, verna, glabra.

- - verna, glabra, floribus umbellatis, albis, petalis bis incisfis.

ALYSSUM vulgare, Polygoni folio, caulenudo; Bursa pastoris, loculo oblongo.

- - segetum, foliis auriculatis, acutis; Myagrum fatium.

- - segetum, foliis auriculatis, fructu maiore; Myagrum.

AMARANTHOIDES, Lychnidis folio, capitulis purpureis.

- - Lychnidis folio, capitulis argenteis, maioribus.

AMARANTHVS, maximus, spicatus, flore

flore rubro, folio obscuriore, purpurascens maculis, semine nigro; Blitum Indicum.

AMARANTHVS simplici Panicula, totus purpureus.

- - maximus, paniculis longis, nodosis propendentibus, rubris, semine rubello.

- - sylvestris Nouae Angliae, totus viridis, spica densa.

- - maximus, spica herbida, laxa.

- - Indicus, spinosus, spica herbacea.

- - Indicus, spinosus, spica et caulibus subinde purpurascens.

- - cristatus flore rubicundissimo.

- - cristatus colore purpureo.

- - cristatus colore Kermesino.

- - cristatus colore aureo.

- - cristatus colore luteo.

- - cristatus colore ex rubro et luteo varius.

- - cristatus flore rubro.

- - cristatus, colore coccineo.

- - cristatus, colore luteo.

- - spicis carneis, interfusa flauedine miscantibus.

- - spicatus sericeus luteo virescens.

- - spicatus flammeo colore lucens.

- - spicatus aeneo colore simul et carneo varius.

AMARANTHVS spicatus aureus et igneus.

- - spicatus, purpureus.

- - spicatus, flavescent.

- - spica inelegante viridi.

- - spica inelegante purpurascete.

- - tricolor.

- - tricolor, folio variegato, obscuriore.

AMBROSIA, maritima.

AMMI, maius.

- - foliis plurimum incis, et non nihil crispis.

ANAGALLIS, flore phoeniceo, mas.

- - flore coeruleo, foemina.

- - Hispanica latifolia, flore maiore, coeruleo.

ANCHUSA, angustifolia, procumbens, Lithospermi facie; Echioides, flore albo.

ANDROSACE, vulgaris, latifolia, annua.

ANETHVM, hortense.

ANGVRIA, Citrullus dicta; Semine nigricante, carne rubra.

- - semine viridi, carne alba.

ANONIS, purpurea, spicata, alopecuroides, maior.

- - viscosa, spinis carens, lutea, maior, odore hirci; Natrix.

- - viscosa, spinis carens, lutea, minor, nec ita graeolens.

- - filiquis ornithopodii.

ANO-

ANONIS, Americana, folio latiore, subrotundo, flore luteo, Anil, quod Indigo Guadelopensium.

- - Asiatica, frutescens, floribus luteis, et amplis; Crotolaria Asiatica.
- alopecuroides, pusilla, hirsuta, flore ex albo et rubro colore mixto.

ANTHYLLOIDES.

ANTIRRHINUM, minimum, flore rubente, rictu luteo.

- - Aruense, angustifolium, flore rubro, folio Linariae.
- - minimum, flore albo.

APARINE, aspera, vulgaris.

- - semine coriandri saccharati.

APHACA.

APIUM, quod Anisum.

APOCYNUM, Americanum; Canadense, Cornuti, folio glabriore, flore umbellato aurantio.

ARGEMONEMEXICANA; Papaver spinosum, foliis lacteis, flore luteo.

ASPERVGO, vulgaris.

ASPERVLA, Aruensis, flore coeruleo.

ASTER, Chenopodii folio, flore purpureo, ingenti, specioso.

ASTERISCUS, annuus, lusitanicus, odoratus; Chrysanthemum conyzoides.

ASTRAGALUS luteus, monspeliacus, procumbens siliqua curua.

ASTRA-

ASTRAGALVS, annuus, angustifolius,
flosculis subcoeruleis: stellatus.

- - Canadensis, flore viridi, flauescente,
fructu triangulari.

- - supinus, filiquis villosis, glomeratis,
hispanicus, filiqua epiglottidis for-
ma flore purpurascete maiore.

- - pumilus, filiqua epiglottidis forma,
flore albo.

ATRIplex hortensis alba.

- - hortensis rubra.

- - sylvestris, folio deltoide triangulari
sinuato.

AVENA, vulgaris, alba.

- - sylvestris, pilosa, aristis recuruis; Fe-
stuca.

B.

BALSAMINE, lutea; Noli me tan-
gere.

- - foemina, flore diluto, rubro.

- - foemina, flore candido, simplici.

- - foemina, flore candido, pleno.

- - foemina, flore, partim candido, par-
tim rubro.

- - foemina, flore carneo, simplici.

- - foemina, flore variegato, pleno.

- - foemina, flore maiore, rubro, spe-
cioso, pleno.

BETA, alba.

BETA rubra, radice Rapae.

BETONICA maxima, folio Scrophulariae, floribus incarnatis.

BIDENS, vulgaris, foliis tripartito diuisis.

- - folio non dissecto; Verbesina; Chrysanthemum.

- - Canadensis, latifolia, flore luteo, semine latiore.

- - Americana, Apii folio; Chrysanthemum.

- - Americana, latifolia, semine angusto.

- - folio subrotundo.

BLATTARIA, folio multifido, flore luteo.

BLITVM, maius, album.

- - rubrum, maius.

- - minus, album.

- - quod! Amaranthus Graecus, sylvestris, angustifolius.

BORRAGINOIDES.

BORRAGO, flore coeruleo.

- - flore albo.

BRASSICA, capitata, alba.

- - capitata rubra.

- - gongylodes.

- - cauliflora; florida.

- - fimbriata.

- - crispa, alba, Neapolitana, Brocoli dicta.

- - campestris, perfoliata, flore albo.

G

BRY-

BRYONIA fructu viridi ex albo striato
Ceylanica foliis profunde sectis.

BVGLOSSVM, Creticum, syluestre, flore
azureo; Buglossoides, flore minus
aperto, folio verrucoso.

- - Creticum, variegatum, flore ex albo,
et rubro vario, folio verrucis albis
obfuso.

BVPHTHALMVM, Creticum, Cotulae
facie, flore albo.

BVERSA PASTORIS, maior, folio non
sinuato.

- - maior, folio sinuato.

C.

C**ALTHA** prolifera.

- - seu Calendula, flore simplici, citri-
no.

- - vulgaris, medio floris ruffo.

- - polyanthos, maior, flore luteo, ple-
no.

- - Aruensis minor.

- - Aruensis, minor, semine echinato.

- - Africana, flore intus albo, extus vio-
laceo; Calendula Africana, humi-
lis.

- - Africana, flore intus albo, extus leui-
ter violaceo, semine pleno, corda-
to, pediculis pene aphyllis.

CAM-

CAMPANULA, Aruensis, erecta, flore violaceo.

- - Aruensis, erecta, flore albo.

- - pentagonia, perfoliata.

CANNABINA, flore purpurascente;
Cannabis spuria.

- - flore magno, luteo, labiis purpureis;
Cannabis spuria, flore maiore.

CANNABIS, non florens; sed semen ferens, sativa.

CAPSICUM, recurvis filiquis. Piper Indicum propendentibus filiquis.

- - fructu oblongo cordiformi rubro.

- - filiquis surrectis cordiformibus fructu rubro.

- - filiquis surrectis rotundis.

- - filiquis breuibus rubris propendentibus.

- - filiquis propendentibus rubris cerasiformibus.

- - filiquis surrectis cerasiformibus rubris.

- - Brasilianum fructu rotundo minimo.

- - filiqua latiore et rotundiore.

- - fructu rotundo maximo dependente pomi amoris forma.

- - Latifolium mali aethiopici fructu magno compresso striato, Americanum.

- - fructu flavescente.

CAPSICVM filiqua propendente oblonga et cordiformi.

- - filiqua oblonga cordiformi.

- - fructu longo, ventre tumido per summum tetragono.

- - filiquis surrectis rotundis parum acuminatis.

- - filiquis flauis erectis.

- - filiquis rotundis surrectis flauis.

- - filiquis surrectis et oblongis breuibus.

- - filiquis surrectis, cerasi forma.

CARDAMINE, pratensis, magno flore, purpurascete.

CARDVVS, spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore purpureo; sylvestris.

- - spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore albo.

- - lanceatus, latifolius, flore purpureo.

- - albis maculis notatus, vulgaris; Mariae.

- - Syriacus, albis maculis notatus, flore purpureo.

- - exoticus, albis maculis notatus, flore albo.

- - nutans, capite magno, odore, nutante.

- - tomentosus, Acanthi folio, vulgaris; Acanthium.

CAR-

CARDVVS, Creticus, Acanthi folio, viridi, flore purpurascente.

- - Canescens, aculeis flauescentibus munitus; Chamaeleon Salmaticense.

- - spinosissimus, caule glabro, moschatus; capite minore, segetibus frequens.

- - palustris, caulium alis, foliisque atroviridibus, spinis mollioribus, plurimis.

- - Lusitanicus canescens alato caule capite lanuginoso.

- - Mariae viridis.

CARLINA, sylvestris.

CARTHAMVS, flore croceo.

CARVI, Carum.

- - semine maiore, Hispanicum.

CASSIA, hexaphylla, minus foetida, foliis Sennae Occidentalis, subtus incanis.

CATANANCE, latifolia, flore luteo; Chondrilla.

CAVCALIS, Aruensis, echinata, magno flore; Echinophora, flore magno.

- - maior, Daucoides, Tingitana.

- - Monspeliaca, echinata; Echinophora, semine magno.

- - prima.

- - Aruensis, paruo flore; Echinophora prima.

- - Africana, folio minori Rutae.

CAVCALIS, sylvestris, folio Chaerophylli.

- - nodosa, echinato semine.

CENTAVRIVM, minus, rubrum.

CEREFOLIVM.

- - sylvestre, Cicutae folio.

CERINTHE, quorundam maior, versicolore flore, ex flauo, purpuro-vio-
laceo.

- - quorundam maior, flore ex rubro
purpurascente.

- - asperior, flauo flore.

- - minor flore flauo, clauso.

CHAMAEMELVM, vulgare.

- - vulgare, tenuifolium, inodorum; Co-
tula non foetida.

- - marinum.

CHENOPODIVM, quod dicitur Pes An-
serinus; Atriplex.

- - folio sinuato, candicante; Atriplex.

- - angustifolium, laciniatum, vel non
laciniatum, maius, et minus.

- - foetidum; Atriplex foetida.

- - Lini folio, villoso; Herba studioso-
rum.

- - Ambrosioides, folio sinuato; Botrys.

- - Ambrosioides, Mexicanum; Botrys
Mexicana.

CHENOPODIO-MORVS, maior; Atri-
plex, mori fructu, vel fragifera.

CHON-

CHONDRILLIS AFFINIS, Trinci-
tella.

CHONDRILLA, Sonchi folio, flore lu-
teo, pallescente; Lactuca sylvestris,
murorum.

CHRYSANTHEMUM, folio Matrica-
riae, flore luteo.

- - folio Matricariae, flore luteo, pleno.

- - flore, partim candido, partim luteo.

- - folio Matricariae, flore albo, pleno.

- - segetum, facie Bellidis sylvestris, fo-
liis glaucis, Papaveris hortensis in-
star, profunde incisus, maius; Chry-
santhemum.

CICER sativum, flore ex purpura ruben-
te, semine rubro.

- - flore candido, fructu pallido.

CICUTA, maior.

- - minor, Petroselino similis; Cyna-
pium.

CLINOPODIUM, fistulosum, pumilum,
flore coerulefcente.

- - Origano simile, flore albo.

CLYMENUM, Hispanicum, flore vario,
siliqua non articulata.

- - Hispanicum, flore vario, siliqua arti-
culata; Lathyrus folio pinnato.

- - Bithynicum, siliqua singulari, flore
minore.

CNICUS, Atractylis lutea.

- - Atractylis alba dictus; Carduus Atra-

Stylidis facie, flore leucophaeo.

CNICVS, exiguus, capite cancellato, femine tomentoso, flore purpureo; Carduus minimus.

- - sylvestris, hirsutior; Carduus benedictus.

COCHLEARIA, Hederae folio.

- - folio subrotundo.

COLOCYNTHIS, fructu rotundo, maiore.

COLUTEA, Africana, annua, foliis parvis, mucronatis, vesiculis compressis.

COMMELINA, flore coeruleo, procumbens, saponariae folio.

CONRINGIA Cheiri folio viridi flore luteo.

CONVOLVVLVS, Indicus, flore violaceo, maiore.

- - Indicus, flore albo, purpurascens, semine albo.

- - flore coeruleo, folio hederaceo.

- - Lusitanicus, flore azureo.

- - Lusitanicus, flore et semine albo.

- - Siculus, annuus, coeruleus, minimus, flore paruo, auriculato.

CONYZA, coerulea, acris.

- - minor, flore globofo, luteo; Chrysanthemum conyzoides, palustre.

- - Americana, Lamii folio, Cacaliae flosculis; Eupatorium Senecionis facie.

Co-

CORIANDRUM, fatium.

- - sylvestre minus, testiculatum.

CORINDUM, folio, et fructu maiore;
Pisum cordatum.

- - folio, et fructu minore.

CORONA SOLIS, flore aureo, semine
nigro; Chrysanthemum.

- - maxima, flore aureo, semine albo.

- - maxima, flore aureo, semine cinereo.

- - maxima, flore aureo, semine striato.

- - flore pallido sulphureo, semine ni-
gro.

- - flore pleno, aureo, semine albo.

- - flore flavescente, pleno, radio mino-
re, semine albo.

- - flore flavescente, pleno, semine fu-
sco.

CORONILLA, Cretica, herbacea, flore
paruo purpurascete.

CORONOPUS, hortensis.

CORISPERMUM hyssopifolium.

COTULA, flore luteo, radiato.

- - flore pallido, radiato.

- - flore luteo, nudo; Chrysanthemum
Valentinum.

CUCUMIS, oblongus, sativus, vulgaris,
flore luteo.

CUCURBITA, lagenaria, flore, et fructu
albo, folio maiore Melonis.

- - longior.

- - latior.

CVMINOIDES, vulgare; Cuminum
fylueftre, capitulis globofis.

CVMINVM.

CVSCVTA.

CYANVS, floridus, odoratus, Turcicus,
flore purpureo.

- - odoratus, Turcicus, flore albo.

- - moschatus, flore luteo; moschatus
Orientalis.

- - fegetum, flore coeruleo.

CYN OGLOSSVM, minus, hirsutum, vi-
neale, flosculis minimis, coeruleis.

CYSTICAPNOS, Africana, scandens.

D.

DAVCVS, fatiuus, radice alba; Sta-
phylinus fatiuus.

- - fatiuus, radice Aurantii coloris.

- - fatiuus, radice atro-rubente.

DELPHINIVM, Platani folio; Staphisa-
gria.

- - fegetum, flore coeruleo.

- - hortense flore coeruleo simplici.

- - hortense flore coeruleo pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo
pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo
simplici.

- - hortense flore carneo simplici.

- - hortense flore carneo pleno.

DEL-

DELPHINIVM hortense flore niueo simplici.

- - hortense flore niueo pleno.
- - hortense, flore pleno, albo punctis et lituris coeruleis elegantissime vario.

E.

ECHINOPVS, minor, capite magno, flosculis purpuro - violaceis.

ECHIVM, ramosius, annuum, flore suauiter rubente, caule rubris punctis notato.

ELATERIVM.

ENDIVIA, seu Intybus vulgaris.

- - vulgaris ; Cichorium latifolium, flore candicante.
- - flore coeruleo.
- - crispa.

ERVCA, syluestris, flore luteo, foetens, foliis magis profunde dissectis.

- - maior, sativa, flore albo, striato.

ERVAGO, segetum.

- - semine crispo.

ERVVM.

ERYSIVM.

- - Monspeffulanum, Sinapios folio ; an maius, et angustifolium ?

ERYSIMVM, polyceratium.

EVPATORIO-PHALACRVM Balsaminae folio.

- - Indicum Scrophulariae folio capitulo paruo radiis quinis ad basin ornato hispidis et glutinosis.

EUPHRASIA.

- - pratensis, rubra.

- - non ramosa, pratensis, flore coeruleo, purpurascente.

F.

FABA, maior.

- - minor.

FAGONIA, Cretica, spinosa.

FAGOPYRVM, vulgare, erectum; Frumentum Saracenicum.

- - vulgare, scandens: Frumentum Saracenicum.

FERRVM EQVINVM, filiqua singulari.

- - filiqua multiplici.

FICOIDES, Africana, folio Plantaginis, undulato, micis argenteis adperso, flore argenteo.

- - Africana, procumbens, Portulacae folio, flore luteo; Kali aizoides, Canariense.

- - siue Ficoidea, Hispanica, folio longiore.

Fi-

FILAGO, quae Impia.

- - minor, repens.

- - minor, tomentosa, erecta; Gnaphalium.

FOENICULUM, vulgare, Italicum, semine oblongo.

FOENUM GRAECUM.

- - sylvestre, alterum.

- - polyceratum creticum, maius, flore luteo.

- - polyceratum, minus.

- - sylvestre, Meliloti facie.

FUMARIA, vulgaris, flore purpureo.

- - minor, tenuifolia, flore niueo.

G.

GALEOPSIS, annua, Hispanica, rotundiore folio.

- - patula, segetum, flore purpurascente; Ladanum segetum, folio latiore.

- - flore paruo, roseo, quae Stachys arvensis, minima.

GARIDELLA.

GERANIVM, Africanum, Coriandri folio, flore incarnato, et striis rubris.

- - Africanum, vuae crispae folio, floribus exiguis, rubellis.

- - minori folio, rotundo.

GERANIVM, semine nigro, coeruleo
flore; Bohemicum, minus, Batra-
chioides, annuum.

- - annuum, rotundifolium, montanum,
faxatile, lucidum, foliis crassis.

- - Creticum, acu longissima, flore coeru-
lescente.

- - Cicutae folio minus, et supinum.

- - moschatum, Cicutae folio.

- - folio Alceae, tenuiter laciniato, flore
exiguo purpureo, semine tenui.

GLAUCIVM, hirsutum, flore phoeni-
ceo; Papauer corniculatum.

- - glabrum, flore phoeniceo.

- - flore violaceo; Papauer cornicula-
tum.

GRAMEN, daetylon, angustifolium, spi-
cis villosis.

- - daetylon, folio latiore; Gramen
Ischaemon.

- - daetylon, Orientale, maius, frumen-
taceum, semine Napi.

- - seu Festuca aenacea, sterilis, spicis,
dependentibus, Bromos dicta.

- - alopecuroides, seu paniceum, spica
rotundiore.

- - alopecuroides, minus, spica virescen-
te, diuulsa.

- - Barcinonense.

- - tremulum, maius, phalarinum.

GRAMEN, tremulum, maximum, phalaroides, citrinum, maius.

- - tremulum, minus, panicula parua.
- - Africanum, aculeatum, echinatum.

H.

HEDYPNOIS, Hieracium, capite inclinato femine adunco.

HEDYSARVM, annuum, flore rubente, filiqua undulata.

- - annuum, angusto viciae folio, flore paruo purpurascente.

HELIANTHEMVM, salicis folio; Cistus humilis, annuus.

- - annuum, Rosmarini folio, flore luteo, minori, perianthio striato, vesicario.

HELIOTROPIVM, maius.

- - Americanum, vel Canariense, Hormini folio, flore coeruleo.
- - minus, angustifolium, aruense, hirsutum, flore minore; Scorpiurus.
- - angustifolium, palustre, glabrum; Echium Scorpioides.

HESPERIS, Leucoii folio, non serrato; Leucium luteum, sylvestre, angustifolium.

- - Leucoii folio, dentato, paruo flore, luteo.

HESPERIS, maritima, flore rubro, latifolia, filiqua tricuspide; Leucium.

HIERACIVM Echiioides, capitulis cardui benedicti, flore luteo.

- - amygdalas amaras olens, vel odore Apuli.

- - lanatum; Sonchus.

- - medio nigrum; Baeticum maius, barbatum.

- - folio dentis leonis, flore suauerbente, foetens, Apulum.

- - folio Chondrillae, glabrum; Chondrylloides.

- - minus, dentis leonis folio, oblongo, angusto, glabro.

- - folio Endiviae, capite magno, striato.

- - feminis pappo rigido.

HORMINVM, satium, coma purpureo-violacea.

- - coma rubra.

HYOSCYAMVS, vulgaris, vel niger.

HYOSERIS.

HYPECOM, Fumariae folio, flore luteo.

I.

IACEA, stellata, folio Papaveris erratici; Calcitrapa.

IACEA, stellata, spina solstitialis dicta,
cyani folio.

- - spinosa, caule alato, capite lanugino-
so.

- - Cyanoides, caule alato, peregrina,
Napi folio.

- - foliis cichoraceis, villosis, altissima,
flore purpureo; Stoebe Salmati-
censis.

- - cauliculis squamatis, argentea, ma-
ior, flore purpurascente.

- - foliis candicantibus, tenuiter lacinia-
tis, calyculis non splendentibus.

IACOBAEA, Afra, folio Botryos.

- - Africana, flore amplo, purpu-
reo, elegantissimo, folio Sene-
cionis.

- - Africana flore albo.

- - Senecionis folio, viscoso, flore luteo;
Pannonica.

- - Aegyptiaca folio glauco Coronop-
pi.

IALAPA, flore flauo; Mirabilis Peru-
uiana.

- - flore purpureo.

- - rugoso fructu.

- - flore albo, purpureo, eleganter va-
riegato.

IONTHLASPI, spicatum.

K.

KALI, spinosum.

KETMIA, vesicaria, Veneta.

- - vesicaria, Africana; Alcea capitis bonae spei.

KNAWEL; Polygonum, graminis folio.

L.

LACHRYMA IOBI; Lithospermum arundinaceum.

LACTUCA, fylvestris, costa et foliis in ambitu spinosis.

- - fylvestris, angusto, saligno, et longiore folio, costa spinosa, albicante.

LACTUCAE variae species, ex illis LV. quas retulit Boerh.

LAMIVM, folio, caulem ambiente; Galeopsis.

LANCISIA Pontederac.

LAMPSANA; Endivia Napifolia.

LAPATHVM, Aegyptiacum, capsula barbata.

LATHYRVS, distoplatyphyllos, hirsutus, magno, et paramoeno, odore flore.

LA

LATHYRVS, praecedentis similis, magno flore, albo, et odore vexillo rubro.

- - Tingitanus, filiquis Orobi, flore amplo, ruberrimo.

- - Hispanicus, flore ochroleuco.

- - Indicus, flore purpureo, filiqua hirsuta.

- - angustifolius, filiqua Ochri, alata, vexillo coeruleo, filiqua latiore.

- - angustifolius, idem, flore albo.

- - sativus, flore albo.

- - Zeylanicus.

LAVATERA, folio, et facie Althaeae, flore albo.

- - Africana, flore pulcherrimo; Malua, semine recto, Pannonica, vel aestiva, trimestris, Hispanica.

LENS, vulgaris.

- - maior, vulgaris, semine cinereo, ex nigro variegato.

LEVCANTHEMUM, Bellidis facie, umbelliferum; Aster Canadensis.

LINARIA, arvensis, coerulea.

- - triphylla, minor, flore luteo, pallido, calcari purpureo.

- - Chalepensis, flosculis albis.

- - hirsuto folio, subrotundo, flore, ex herbido flauescente.

- - hirsuto folio, acuminato, in basi auriculato, flore luteo.

LINOSYRIS.

LINVM, fatium.

- - fatium, latifolium, Africanum, fructu maiore.
- - pratense, flosculis albis, catharticum.

LOTVS, flore rubro, filiqua angulosa; tetragonolobus.

- - praecedenti similis, folio variegato.
- - tetragonolobus, flore luteo, filiqua angulosa, angusta.
- - filiquis Ornithopodii.
- - pentaphyllos, minor, hirsuta, angustissima filiqua; oligoceros, Cretica, filiquis longis, erectis.
- - pentaphyllos, filiqua cornuta; Trifolium corniculatum, Creticum.

LVFFA, Arabum; Cucumis reticulatus.

LVPINVS, peregrinus, maior, vel villosus, coeruleus.

- - sylvestris, flore coeruleo, minore.
- - peregrinus maior, flore incarnato.
- - satius.
- - sylvestris, flore luteo.

LVTEOLA, salicis folio; Pseudostrium,

LYCHNIS, segetum maior, flore rubescente.

LYCH-

LYCHNIS, Pseudo-Melanthio similis,
Afra, glabra, angustifolia.

- - Cretica, flore paruo, calyce striato,
purpurascete.

- - sylvestris, latifolia, calyculis, turgidis,
striatis, pericarpio ampullato, pyra-
midali, fulcato, flore roseo.

- - sylvestris, angustifolia, calyculis tur-
gidis, striatis, minoribus, pyramida-
libus, flore carneo.

- - segetum, rubra, folio Perfoliatae;
perfoliata, et vaccaria, aut pentago-
nia.

- - Orientalis, annua, supina, Anthirrini
folio, flore minimo, purpurascen-
te.

- - viscosa, purpurea, latifolia, laevis;
Centaurium adulterinum.

- - viscosa, alba, latifolia, laevis.

- - viscosa, foliis inferioribus Bellidis,
flore minimo, rubro.

- - noctiflora; Ocymoides non specio-
sum.

- - sylvestris, minima, flore muscoso.

- - segetum, meridionalium, hirsuta,
floribus albis, vno versu disposi-
tis.

- - hirta, minor, floribus variegatis; Lu-
sitana, flore picto.

LYCHNIS, segetum, meridionalium, hirsuta, floribus roseis, vno versu dispositis.

- - pericarpio pyramidalis, striato, reticulato, viscosa, flore luteo, interne carneo, semine cuboide, punctato.

LYCHNI-SCABIOSA, flore rubro; Scabiosa Orientalis.

LYCOPERSICVM, fructu cerasi, rubro.

- - fructu cerasi luteo.
- - Galeni. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.
- - fructu rubro non striato.
- - fructu rubro non striato.
- - fructu luteo.
- - fructu striato duro.
- - fructu striato duro sine umbone.
- - fructu striato duro minimo.

M.

M**AIORANA**, vulgaris, annua.

MALVA, vulgaris, flore minore, folio rotundo.

- - Syriaca, pumila, flosculis albidis, ad cauliculos conglobatis.
- - Sinensis, erecta, flosculis albis, minimis.
- - vulgaris, flore maiore, subrubente, folio sinuato.

... **MAL-**

MALVA, vulgaris, flore purpureo, pulchriore.

- - sylvestris, flore albo, folio sinuato.
- - rotundifolia, Italica, flore amplo purpurascente; Althaea.
- - folio vario, stellata.
- - foliis crispis.
- - Americana, vltimi folio, floribus conglomeratis.

MALVINDA, vnicornis.

MAYS, granis aureis; Frumentum Indicum.

- - granis rubis.
- - granis coeruleis.
- - granis flauescentibus, vel albidis.

MEDICA, fructu echinato, maiore.

- - fructu echinato, maiore, albidior.
- - fructu echinato, maiore, oblongo, spinis sursum et deorsum.
- - fructu echinato, maiore, rotundior, spinis sursum et deorsum spectantibus.
- - fructu echinato, minori.
- - fructu echinato, minori, spinis firmis; Trifolium cochleatum.
- - fructu echinato, exiguo.
- - fructu echinato, minimo; echinata hirsuta.
- - fructu echinato, mediocri, rectis brevioribus, spinis.

- MEDICA, fructu echinato, dicarpos, alba.
- - fructu echinato, spinis rarioribus, reflexis, fructu tribuloide.
 - - fructu echinato, ad latera reflexis spinis brevioribus.
 - - fructu echinato, echinis rectis, brevioribus.
 - - fructu echinato, minori, echinis brevioribus.
 - - fructu quasi doliato, maiore, non spinoso; similis fructui Trifolii falcati.
 - - fructu doliato, minore, non spinoso.
 - - fructu doliato, minore, quodammodo spinoso.
 - - Cretica, orbiculata, fructu vtrinque turbinato, maiore.
 - - fructu scutellato, maiore, oris crispis.
 - - fructu scutellato, maiore, oris non crispis.
 - - fructu scutellato, minore; similis fructui trifolii falcati.
 - - fructu cochleato, singulari.
 - - fructu cochleato, minori, ad margines leuiter echinato.
 - - fructu cochleato, maiore, capsula turbinata, plana.
 - - fructu cochleato, dicarpos, turbinata, rugosa.

MEDICA, fructu cochleato, minore, rugoso, albo.

MEDICAGO, annua, trifolii facie, siliqua falcata, crenata; Medica.

- - Vulnerariae facie, hispanica, flore luteo; Falcata, folio Anthyllidis.

- - maritima, annua, trifolia, polycarpus, fructu toroso, non spinoso.

MELAMPYRUM, coma purpurascens.

- - luteum, sylvaticum.

MELILOTVS, supina, Cretica, folliculis rugosis, minoribus, spicis densis.

- - lutea, seminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo; Orientalis, folliculis rugosis, maioribus.

- - Messanenensis; Italica, minor, folliculis striatis, singularibus.

- - capsulis, reni similibus, in capitulum congestis; minima.

- - maior, odorata, violacea.

- - Cretica, fructu plano, orbiculari, maximo; trifolium peltatum.

MELO, vulgaris.

- - reticulatus.

- - rotundus, minimus, cortice tenuissimo, saccharinus.

M E L O, turbinatus.

- - rotundus parvus, aurantii figura et colore.
- - fructus cortice, atro viridi et verrucoso carne crocea, saccharinae dulcedinis.
- - Turcicus, semine signato. aliaeque species.

M E L O N G E N A, fructu oblongo, violaceo.

- - fructu oblongo, flauo.

M E L O P E P O, fructu maximo, albo;
Pepo Indicus maximus, compressus.

- - verrucosus; Pepo verrucosus.
- - tuberosus, et verrucosus.

M E R C U R I A L I S, testiculata, mas.

- - spicata, foemina.

M I L I V M.

- - nigris granis.
- - arundinaceum, subrotundo semine; Sorgho nominatum, fructu albo.

M O L D A V I C A, quae Cedronella, flore coeruleo.

- - quae cedronella, flore albo.
- - Orientalis, flore minore, purpurascens, folio ocymi.
- - Orientalis, Salicis folio, flore maiore, coeruleo.

MOLVCCA, laevis; Melissa Moluccana,
odorata.

- - spinosa.

MOMORDICA.

- - semine magno.

MYAGRVM, monospermum, latifolium,
glabrum, filiqua ventricosa, breui;
Raphanistrum.

MYOSOTIS, Hispanica, segetum; Cera-
tion, vel Alfine corniculata.

- - Orientalis, perfoliata, lychnidis fo-
lio.

- - aruensis, hirsuta, paruo flore.

MYOSVRVS.

MYRRHIS, nodosa, annua, semine aspe-
ro.

- - annua, semine striato, laeui, pri-
ma.

- - annua, semine striato, villoso, incano;
Daucus Creticus.

N.

NAPVS, sylvestris

- - satius.

NASTVRTIVM, sylvestre.

- - hortense, vulgatum.

- - crispum.

- - sylvestre, folio osyridis.

NASTURTIVM, sylvestre, capsulis cristatis, repens, folio cornu cerui.

- - sylvestre, tenuissime incisum.

NICOTIANA, maior, latifolia, flore rubro.

- - minor, flore luteo; Petum aut Priapaea.

- - minor, flore luteo; infundibulo et calyce longiore.

NIGELLA, aruensis, cornuta, flore coeruleo.

- - latifolia, flore maiore, simplici, coeruleo; Hispanica.

- - latifolia, flore simplici, albo, hispanica.

- - angustifolia, flore coeruleo, maiore, simplici, Romana.

- - angustifolia, flore maiore, pleno, coeruleo, Romana.

- - flore minore, simplici, candido.

- - Chalepensis, lutea, corniculis longioribus.

NISSOLIA, vulgaris; Lathyrus angustifolius, sine capreolis.

O.

OCHRVS, folio integro, capreolos eminente.

OCHRVS,

OCHRVS, folio integro, capreolos emittente, semine nigro.

OCYMVM, odore anisi.

- - latifolium, maculatum, vel crispum.

- - foliis, fimbriatis, viridibus.

- - caryophyllum, maius.

- - vulgatus, medium, flore et caule albo.

- - medium, foliis viridibus, in ambitu luteis.

- - minus, angustifolium, foliis serratis.

- - minimum, caryophyllum.

- - latifolium.

OMPHALODES, Lusitanica, lini folio, flore albo.

ONAGRA, angustifolium.

ORNITHOPODVM, radice, tuberculis nodosa.

- - Portulacae folio; Scorpioides.

- - floribus luteis, filiquis non articulatis, in circulum contortis.

ORYZA.

P.

PANICVM, Germanicum, panicula minore.

- - Italicum, panicula maiore.

PAPAYER, capitatum, vulgare.

PA-

PAP AVER.

- - laciniatum rubrum, vnguibus purpureis.
- - laciniatum rubrum, vnguibus albis.
- - multiplex, album, oris rubicundis.
- - flore multiplicato, incarnato.
- - flore multiplici, purpurascente.
- - flore pleno, album.
- - flore pleno, violaceo.
- - flore pleno, eleganter striato, laciniato.
- - flore pleno argentei coloris.
- - flore pleno rubrum.
- - flore miniato pleno.
- - hortense semine albo flore leuiter purpureo.
- - hortense, semine nigro, syluestre Dioscoridis, nigrum Plinio.
- - hortense, semine albo, flore candido, rubris maculis infecto.
- - hortense, semine albo, flore cinereo vndique purpureo.
- - hortense, semine albo, satium Dioscoridis, album Plinii.
- - erraticum, maius, Rhoeas Dioscoridi, Plinio, Theophrasto.
- - erraticum, flore pleno.
- - erraticum, maius, florum vnguibus albis.
- - erraticum, maius, foliis florum variegatis.

PAP AVER erraticum, maius, flore albo.

- - erraticum, flore pleno, purpurascens.

- - erraticum, flore pleno, igneo.

- - erraticum, flore pleno, igneo, marginibus candidis.

PARTHENIASTRUM, Americanum, Ambrosiae folio, paruo flore, albo; Matricaria, Americana.

PEDICULARIS, pratensis, lutea; Crista galli.

PELECINVS, vulgaris; Vtrinque serrata.

PEPO, vulgaris; Cucurbita maior, rotunda.

- - rotundus, aurantii forma.

- - oblongus.

- - compressus, maior.

- - rotundus, aurantii colore.

- - fructu paruo, pyriformi ex viridi et albo variegato.

- - tuberosus et verrucosus flauescens.

- - tuberosus et verrucosus flauus.

- - seu Melopepo clypeatus, compressus et angulosus, colore flauo.

- - seu Melopepo, clypeatus, compressus et angulosus, ex flauo et viridi variegatus.

PERFOLIATA, vulgarissima, aruensis.

PERSICARIA, Orientalis, maxima, Nicotianae folio, calyce florum purpureo.

PHALANGIVM, humile, Africanum, floribus luteis.

PHALARIS, maior, semine albo.

- - spica longiore.

PHASEOLVS, vulgaris, fructu albo.

- - vulgaris, fructu rubro.

- - vulgaris, fructu luteo.

- - vulgaris, fructu albo, et nigro, striato.

- - vulgaris, fructu albo, minore, veneris dictus.

- - vulgaris, minor, fructu incano, cuius hilus limbo nigro cingitur.

- - vulgaris minor, fructu albo, cuius hilus limbo fusco cingitur.

- - puniceo flore, fructu magno, nigro.

- - puniceo flore, fructu, ex nigro, et colossino variegato.

- - Indicus, flore, et fructu candidissimis.

- - Aegyptiacus, nigro semine; Lablab.

- - Aegyptiacus, semine ruffo.

- - Aegyptiacus, semine obsolete luteo.

- - orthocarpos, Indicus, flore coeruleo,

ruleo, filiqua crassiore, semine nigro.

PHASEOLVS, orthocarpus, Infulae Barbados, flore pallido, rubente, filiqua tenuiore, semine, ex purpureo nigricante.

PISVM, maius, quadratum, fructu subflauo.

- - filiqua carnosâ, incurua, seu falcata, eduli.

- - nanum.

- - praecox, Anglicum.

- - hortense, maius, flore et fructu albo.

- - comosum.

- - cortice eduli, fructu fusco.

PLANTAGO rosea, floribus quasi in spica dispositis.

- - folio denticulato, angusto, paniculis, Lagopi.

POLYGALA, flore coeruleo.

POLYGONVM, vulgare, mas.

PORTVLACA, domestica.

- - aurea, foliis flauis.

- - angustifolia, sylvestris.

- - Curassauica, lanuginosa, procumbens.

PSYLLIVM, maius, erectum, latifolium, annuum.

Q.

QVAMOCLIT, Americana, folio hederæ, flore coccineo.

R.

RANUNCULUS, stellatus, echinatus, Creticus.

- - aruensis, echinatus, minor.

RAPHANISTRUM, segetum, flore luteo, vel pallido.

- - flore albo, striato, siliqua articulata, striata, minore.

- - dispermum.

RAPHANUS, maior, niger, orbicularis.

- - maior, niger, radice pyriformi, vel longiori.

- - maior, albus, orbicularis.

- - maior, albus, radice pyriformi, vel longiori.

- - minor, oblongus.

- - minor orbicularis.

- - minor oblongus ex rubro striatus.

RAPISTRUM, monospermum, orientale, Raphani folio, flore luteo, maximum.

RAPVUM, rotundum.

- - radice oblonga.

RESEDA, flore albo.

RHA-

RHAGADIOLVS, hieracium filiqua falcata.

RICINOIDES, ex qua paratur Tournesol Gallorum.

RICINVS, vulgaris.

- - Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante.

- - totus ruber.

- - vulgaris, minor.

RORELLA, florida.

RVBIA, sylvestris.

S.

SALICARIA, hyssopi folio, latiore; Gratiola minor.

SALICORNIA.

SAMOLVS.

SATVREIA, fatiua.

SCABIOSA, Syriaca, annua, flore coeruleo, Syuan Syriae dicta.

- - altissima, annua, foliis Agrimoniae nonnihil similibus.

- - stellata, folio laciniato, maior; Hispanica, flore albo.

- - stellata minor, folio laciniato, flore pallido coeruleo, hispanica.

- - stellata prolifera.

- - peregrina, rubra, capitulo oblongo.

SCABIOSA, peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo, odore Zibethi.

- - peregrina, alba, capitulo oblongo.

- - Cretica, capitulo pappos mentiente.

SCANDIX, femine rostrato, vulgaris.

SCLAREA, glutinosa, annua, flore caesio, foliis oblongis, integris, odorem Thymi debiliorem reddentibus.

SCOLYMVS, Chrysanthemus; Carduus Chrysanthemus, lactescens.

SCORPIOIDES, folio Bupleuri; Campoides hispida, filiquis minus contortis.

- - filiqua crassa, instar Litui contorta.

- - Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis.

SCORZONERA, laciniatis foliis minoribus, flore luteo; Tragopogon.

SCROPHULARIA, folio vrticae, flore rubro.

- - annua, lamii folio, flore luteo.

SECURIDACA, lutea, maior.

SEDUM, echinatum, flore albo.

- - Cepaea dictum, floribus purpurascenscentibus.

SENECIO, vulgaris.

- - Aegyptiacus, folio matricariae.

SE-

SENECIO, Africanus, altissimus, Blattariae, vel Hieracii folio, odore Carotae.

- - Bonariensis, purpurascens, foliis imis Coronopi.

SERRATVLA, semine ciliari, elegantissimo; Crupina Belgarum.

SESAMVM, veterum.

SICYOIDES, Americana, fructu echinato: Bryonioides vulgo dicta; Cucumis.

SIDERITIS, aruensis, latifolia, flore albo, barba luteola.

- - flosculis vix ex vasculis prominentibus.

- - vulgaris erecta, Betonicae angustiore folio, flore albo, et luteolo.

SINAPI, rapi folio, semine rusto, filiqua glabra.

- - Apii folio, filiqua hirsuta, semine flauo.

- - Indicum, lactucae folio, filiqua glabra.

- - filiqua hirsuta, semine nigro, minore, an quernis foliis?

- - filiqua hirsuta, semine nigro, maiore.

- - Chinense, foliis Acanthi, tenuius, et crebrius laciniatum, filiqua glabra.

SINAPISTRVM, Indicum, pentaphyllum, flore carneo, non spinosum.

SISYMBRIVM, folio absynthii minoris;
Accipitrina.

SOLANVM, acinis nigricantibus.

- - acinis puniceis.

- - acinis ex luteo virescentibus.

- - Guineense, fructu Cerasi magno, nigerrimo, umbellato.

SONCHVS, asper, non laciniatus.

- - laevis, laciniatus, latifolius, flore luteo.

- - laevis, laciniatus, latifolius, flore niueo.

- - asper, laciniatus, Creticus, flore luteo, capitulis magnis, semine curuo.

SPINACHIA, vulgaris, capsula feminis aculeata.

- - Cretica, supina, capsula feminis aculeata.

STRAMONIVM, fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici; Datura Turcarum.

- - fructu spinoso, oblongo, caule, et flore violaceo.

- - ferox.

- - fructu spinoso, rotundo, flore duplici, violaceo.

- - folio hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo,

tundo, spinis innoxiiis ornato;
Stramonia.

STRAMONIVM, flore albo, duplici et triplici.

T.

TAGETES, maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido, flos Africanus.

- - maximus, rectus flore maximo multiplicato pallido.
- - maximus, rectus, flore simplici, aureo.
- - maximus, rectus, flore maximo multiplicato.
- - Indicus, flore simplici, fistuloso.
- - Indicus, flore fistuloso, duplicato.
- - Indicus, flore simplici, fistuloso, pallido.
- - Indicus, flore fistuloso, duplicato, pallido.
- - Indicus, medius, flore simplici, luteo, pallido.
- - Indicus, medius, flore luteo, multiplicato.
- - Indicus, minor, simplici flore, siue Caryophyllus Indicus.
- - Indicus, minor, multiplicato flore, seu Caryophyllus, Indicus, ple.

plenus, flore luteo rubescente,
minor.

THLASPI, aruenſe, ſiliquis latis.

- - ſpicatum, Perſicum, perfoliatum,
marinum.

- - Creticum, flore rubente.

- - Cappadocicum, flore albo.

THLASPIDIVM, Monſpelienſe, Hiera-
cii folio, hirsuto; Leucoium biſcu-
tatum.

- - Apulum, ſpicatum; Leucoium aſpe-
rum, biſcutatum, minus.

TITHYMALVS, foliis rotundis, non cre-
natis.

TORDYLIVM, maximum, limbo minus
granulato.

- - Narbonenſe, minus.

- - Apulum, minimum.

TRACHELIVM azureum vmbelli-
ferum.

TRIBVLVS terreſtris, ciceris folio, fru-
ctu aculeato.

TRIFOLIVM, Lagopoides, hirsutum, hi-
ſpanicum, flore coccineo, folio ro-
tundo; Lagopus latifolius.

- - Lagopoides flore ſubluteo.

- - aruenſe, humile, ſpicatum; Lago-
pus.

- - humile, flore albo, ſpica longiore, glu-
mis breuibus, incanis.

TRI-

TRIFOLIUM, subterraneum.

- - flosculis albis, in glomerulis oblongis, asperis, ex geniculis florens.
- - Lupulinum, minus.
- - stellatum, flore ex albo rutilante, spica longa, glumis longis, hirsutis.
- - caule nudo, glomerulis glabris.
- - maius, Apulum, rotundifolium, glabrum, flore purpurascete, echinato capite, calyce vesicario.
- - capitulo spumoso, laeui, fragiferum.
- - Lagopoides, flore albo, seu Alopecurum, spica globosa.

V.**V**ALERIANA Calcitrapae folio.

VALERIANELLA, aruensis, praecox, humilior, semine depresso, nudo, umbilicato, foliis integris, flore dilute coerulescente.

- - aruensis, praecox, humilis, foliis serratis, flore albo, semine umbilicato, pyramidalis.
- - semine stellato, folio serrato, flore albo, scabiosae semine.

V A L E R I A N E L L A, Cretica, fructu vesicario.

- - cornucopioides, rubra, Indica.
- - cornucopioides, Mauritanica, flore purpureo, longiore; rubra, hispanica.

V E R B E N A, tenuifolia; Verbenaca supina.

V E R O N I C A, minima, repens.

- - Cymbalariae folio, verna.
- - folio Chamaedryos.
- - coerulea, trifido, aut quinquifido folio; Rutae folio.
- - Chia, folio Cymbalariae, verna, flore albo, umbilico virescente.

V I C I A, Narbonensis, latissima, folio non ferrato.

- - sativa, vulgaris, semine nigro, segitum.
- - flore albo, filiqua longa, glabra.
- - Africana, folio, et filiquis latis, hirsutis, propendentibus, flore ochroleuco.
- - latifolia, filiqua tumidiore, semine nigrescente, flore maiore, roseo.
- - angustifolia, filiqua glabra, longiore, et minus depressa, flore purpureo.

VICIA, Graeca, flore suaüerubente, filiquis breuiffimis.

- - Bengalensis, hirsuta et incana, filiquis Pifi.

- - floribus et filiquis minimis; Cracca

VIOLA, tricolor, hortensis, repens; Flos Trinitatis, aut Iacea.

- - bicolor, aruensis.

VIRGA AVREA, annua; Conyza Canadensis, acris, alba, Linariae folio.

- - maior, foliis glutinosis, et graeolentibus; Conyza maior.

- - minor, foliis glutinosis, et graeolentibus.

VISNAGA; Gingidium.

VERTICA, minor.

- - pilulas ferens, Romana, folio serrato.

- - pilulifera, Parietariae folio.

VVLNERARIA, pentaphyllos; Anthyllis Hispanica.

- - pentaphyllos, flore purpureo.

X.

XANTHIVM, Bardanae folio, minore.

- - maius, Canadense, fructu, aculeis aduncis munito.

XANTHIVM Lusitanicum, spinosum.

XERANTHEMVM, flore simplici, purpureo, maiore.

- - flore simplici, albo; Ptarmica Austriaca.

- - flore albo pleno, et purpureo pleno,

Z.

ZAINTHA; Cichorium verrucarium.



